

00:07:46

زمان مانده

پرسش‌های معماری های کودکان 2 -

نام درس

پرسش‌های معماری کودکان


عنوان آزمون

کدام گزینه صحیح نی باشد؟

- ☐ ضایع‌ترین محل وقوع درهم رفتگی روند دیوارهای مسوون درجه این‌نوسنگل است
- ☐ جرف‌های به روش فردت راصند، راج‌ترین درسم ناهمداری‌های انورکتال شرجوارن است
- ☐ فرورفتگی همناس و چشم‌های گود خنده در کودک دچار اسهال، نشانه دهمدرناسیون درجه متوسط می باشد
- ☒ اسل کنواوری معماری ضایع‌ترین ضایع‌ترین معماری گلاکوری می باشد

33 در مورد بیماری آرتریت ایدیوپاتیک جوانان کدامیک از موارد زیر را صحیح می دانند؟

- ☐ چسبندگی بین سطوح استخوانی و آنتیلور در مراحل اولیه بیماری اتفاق می افتد
- ☒ بروز علائم گلاسیک آرتریت صیقلی در این بیماری کمتر دیده می شود.
- ☐ انجام ورزش های وفایز بااحتیاط بهبود عملکرد مفاصل و کاهش درد می شود
- ☐ این بیماری در کودکانی که سیستم ایمنی آن ها حساس تر است کمتر رخ می دهد



تأمین محیط آرام و خلوت و کاهش پروسیجرهای تهاجمی غیرضروری برای کدام یک از کودکان بستری زیر در اولویت است؟

- ☒ کودک 10 ساله ای با حمله آسم همراه با اضطراب و علائم تنگی نفس
- ☐ کودک 5 ساله با اوسمی پیشرفته و مناسبتز گسترده و کاهش هوشیاری
- ☐ کودک 14 ماهه مبتلا به تترالوژی فالو با علائم حمله هایپر سدانوتیک
- ☐ کودک 9 ساله مبتلا به آرتریت اندوپاتیک با بی قراری و ذکر درد مفاصل

کدام مورد در خصوص آماده کردن کودکان برای پروسیجرها بر اساس مشخصات تکاملی آن صحیح نمی باشد؟

کودک خردسال را در مراقبت مستقیم سهم نمایند (مثل نگه داری وسایل یا برداشتن بانسها)

اجازه دهید کودک شیرخوار با وسایل مسمانوری یا واقعی مراقبت بازی کند ✓

والدین را در مسیر دید شیرخوار نگه دارند.

اجازه دهید با نوجوان دیگری که پروسیجر بنویسی استخوان را تجربه کرده‌اند صحبت کند.

کدام گزینه اولویت دارترین تشخیص پرستاری در کودک مبتلا به لوسمی است؟

☒ خطر عفونت مربوط به تضعیف سیستم ایمنی بدن

☐ خطر تغذیه نامتعادل کمتر از نیاز بدن

☐ غم و اندوه خانواده در ارتباط با احتمال از دست دادن کودک

☐ اختلال در تصویر ذهنی از بدن

2. کدامیک از موارد زیر جزو مشخصات صرع ستئاتوس است؟

☐ کمتر از 30 دقیقه طول می کشد.

☐ کودک در فاصله بین حملات هوشیار است.

☒ رژیم کتوژنیک در کنترل حملات موثر است.

☐ در 24 ساعت فقط یک بار روی می دهد.

6. کدامیک از موارد زیر در مورد آموزش کودک مبتلا به اختلال شناختی صحیح است.

☐ میزان توانایی یادگیری تأثیری در آموزش کودک ندارد

☒ برای آموزش وظایف باید آن را به بخش های متعدد تقسیم کرد.

☐ آموزش مهارت باید در یک جلسه صورت بگیرد

☐ یادگیری مسائل انتزاعی برای کودک راحت تر از عینی است.

18. کدام تدبیر پرستاری در خصوص کودک ۳ ساله مبتلا به فنیل کتونوری صحیح نیست؟

☐ آموزش گوشت کم در رژیم غذایی

☐ توضیح علت اندازه گیری مکرر فنیل آلانین خون به والدین

☒ آموزش مصرف شیر فراوان توسط کودک

☐ حمایت عاطفی والدین کودک دارای بیماری مزمن

☆

L

:

پرستار

نام درس:

پرستاری بیماریهای کودکان

عنوان آزمون:

16. ابزار APPT برای چه مورد به کار می‌رود؟

سنجش میزان درد

سنجش شدت درد

تعیین محل درد

الف و ب

بازگشت به سوال قبلی

بازگشت به سوال بعدی

پایان آزمون

12:14 PM

1/6/2021

01:03:33 زمان مانده: بررسی بیماری های کودکان 2 نام درس: بررسی بیماری های کودکان عنوان آزمون:

14. کودک مبتلا به سلیاک کدام مورد را با یبوستی کمتر متعرف نماید؟

☐ ماکارونی

☐ مویز

☐ برنج

☒ آلفا و ب

نام آزمون: **پرستاری بیماریهای کودکان** نام درس: **پرستاری بیماریهای کودکان** زمان مانده: **01:06:16** نام آزمون دهنده:

19. کدام اقدام پرستاری زیر برای پیشگیری از عفونت در کودک مبتلا به سندرم نفروتیک در مرحله حاد بیماری حیاتی است؟

☐ کنترل مرتب فشار خون

☒ ایزوله معکوس

☐ تشویق کودک به استراحت مطلق

☐ محدود کردن مصرف آب و نمک

⌚ زمان

نام درس: پرستاری بیماریهای کودکان ▾

عنوان آزمون: پرستاری بیماریهای کودکان ▾

1. مهمترین مراقبت پرستاری قبل از عمل در کودک مبتلا به تومور ویلمز چیست؟

☐ آماده سازی کودک برای هر اقدام تشخیصی

☐ کنترل جذب و دفع کودک

☒ پیشگیری از صدمه به تومور هنگام جراحی کودک

☐ توجه به ترس و نگرانی کودک

1. علت بالا بودن فشارخون در کودک مبتلا به تومور ویلمز چیست؟

☒ ترشح رنین زیاد از تومور

☐ ترشح رنین زیاد از کلیه

☐ انقباض عروق کلیوی

☐ انقباض عروق محیطی



مرور پاسخ ها

➤ صفحه بعدی

صفحه : 1 از 36 / تعداد سوال این صفحه: 1

اتمام آزمون

انتخاب برای برگشت به صفحه (0 از 8)

3. کدامیک از مراقبت های پرستاری کودک مبتلا به سندرم نفروتیک نمی باشد؟

☐ ایروله معکوس

☒ محدودیت پروتئین دریافتی

☐ نوری روزانه

☐ محدودیت آب و نمک

نوزاد نارس 30 هفته با دیسترس تنفسی در بخش نوزادان بستری است، کدام روش تغذیه ای زیر را برای این نوزاد بکار می برید؟

گاواژ از طریق فیدینگ نیوب دهانی

TPN ☒

تغذیه دهانی با شیر مادر ☐

تغذیه وریدی با سرم حاوی اسید آمینه + گاواژ نوزاد از طریق نازال فیدینگ ☐

2. کدامیک از موارد زیر در تهیه نمونه خون برای کشت خون نوزاد صحیح نیست؟

☐ گرفتن نمونه خون از کاتتر نافی تازه تعبیه شده

☐ گرفتن نمونه خون از ورید محیطی

☒ تهیه نمونه خون بعد از شروع آنتی بیوتیک

☐ شستشوی محل خونگیری با بتادین

نمره: ۱ از ۱

۳) برای افزایش توانمندی والدین کدام از اقدام زیر را موثر می دانید؟

☐ تشویق والدین برای ملاقات مکرر نوزاد

☐ حمایت از والدین

☒ مشارکت دادن والدین در مراقبت از نوزاد ✓

☐ پاسخگویی به سوالات والدین

نمره: ۱ از ۱

۴) منظور از حمایت والدین در بخش مراقبت ویژه نوزادان چیست؟

☐ پاسخگویی به سوالات والدین

☐ دادن آرامش روانی به والدین

☐ دادن اعتماد به نفس به والدین

☒ همه موارد ✓

نمره: ۱ از ۱

۵) نوزادی دچار افت ساچوریشن تا ۸۷ درصد شده است، اولین اقدام شما چیست؟

☐ دادن اکسیژن به نوزاد

☒ اطمینان از پایین بودن ساچوریشن با کنترل از دو اندام فوقانی و تحتانی ✓

☐ تغییر دادن وضعیت بدن نوزاد

☐ تحریک پوستی نوزاد

نمره: ۱ از ۱

(۱) کدام گزینه، از علائم و تظاهرات صورت در زمان دیسترس جسمی نوزادان، نمی باشد؟

☐ دهان مکعبی☒ ✓ سطحی شدن چین نازولابیال☐ بهم گره خوردن و در هم فرو رفتن ابروها☐ محکم بستن چشمها

نمره: ۱ از ۱

(۲) کدام گزینه به استفاده از روشهای دارویی تسکین درد اشاره دارد؟

☐ TENS☐ Token☒ ✓ آیوتل☐ کالیدوسکوپ

نمره: ۱ از ۱

(۳) کدام مورد در خصوص آزمایش غربالگری هیپوتیروئیدیسم مادرزادی نوزادان و محل لانست زدن پاشنه جهت تهیه خون مربوطه، صحیح نیست؟

☒ ✓ محل لانست زدن، قسمت مرکزی پاشنه پا است.☐ اندازه گیری TSH و T۴ برای تشخیص بیماری لازم است.

Apps TED TED: Ideas worth sp... Allcom buzz - Lave... Nature

۳) کدام مورد در خصوص آزمایش غربالگری هیپوتیروئیدیسم مادرزادی نوزادان و محل لانست زدن پاشنه جهت تهیه خون مربوطه، صحیح نیست؟

نمره: ۱ از ۱

☒ محل لانست زدن، قسمت مرکزی پاشنه پا است. ✓

☐ اندازه گیری، TSH و T۴ برای تشخیص بیماری لازم است.

☐ زمان آزمایش غربالگری هیپوتیروئیدیسم مادرزادی روز ۲ تا ۵ تولد می باشد.

☐ درمان بیماری با داروی سینتروئید و گاهی ویتامین د است.

۴) اقدام در خصوص کدام تشخیص پرستاری در نوزاد مبتلا به هیپوتیروئیدیسم مادرزادی اولویت دار می باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ کمبود آگاهی والدین نوزاد

☐ اضافه وزن

☒ اختلال تنظیم درجه حرارت ✓

☐ اسهال

۵) کدام گزینه در خصوص اقدامات مراقبتی در کودکان مبتلا به بتا تالاسمی صحیح نمی باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ جلب همکاری برای تزریق های مکرر خون و درمان با شلات

☐ ارتقا تطابق کودک و خانواده با بیماری مزمن

☒ کنترل عوارض تزریق دسفرال ✓

☐ ارجاع به مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج

نمره: ۱ از ۱

۶) کدام مورد در خصوص روش‌های تشخیص ریفلاکس معده به مری در نوزادان به کار می‌رود؟

☐ سنجش PH مری به مدت ۲ ساعت

☐ بررسی خصوصیات استفراغ و خون مخفی در مدفوع

☐ سینتی گرافی هسته‌ای

☒ ب و ج ✓

نمره: ۱ از ۱

۷) کدام مورد در خصوص مبنای تشخیص آنمی فقر آهن در کودکان کاملاً صحیح می باشد؟

☐ MCV هفتاد و هفت میکروگرم در متر مکعب در کودک ۲ ساله

☒ افزایش TIBC ✓

☐ اشباع ترانسفرین ۲۵ درصد

☐ کاهش سطح پروتوپورفیرین

نمره: ۱ از ۱

۸) کدام گزینه در مورد تنگی هیپرتروفیک پیلور صحیح می باشد؟

☐ آبریزش دهان و بزاق کف آلود

☐ زائده سوسپسی در قسمت فوقانی شکم

۸) کدام گزینه در مورد تنگی هیپرتروفیک پیلور صحیح می باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ آبریزش دهان و بزاق کف آلود

☐ زائده سوسپسی در قسمت فوقانی شکم

☒ پرستالتیس قابل مشاهده ✓

☐ اختلال در دلبستگی والد- نوزاد

۹) کدام مورد در خصوص نوزاد مبتلا به آترزی مری صحیح نمی باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ اکثراً پس از تولد، تعبیه OGT در نوزاد با مشکل مواجه می شود.

☐ نوزاد آبریزش کف آلود از دهان دارد.

☒ در صورت عدم وزن گیری پس از جراحی، تغذیه با NGT استفاده می شود. ✓

☐ خطر اختلال در دلبستگی والد- نوزاد و اختلال در سازگاری والدین جزو تشخیص های پرستاری است.

۱۰) کدام گزینه در هیپوتیروئیدیسم مادرزادی نوزادان شایع می باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ سفتی بدن

☐ خواب کم

☐ پر مویی

☒ وزن تولد نوزاد ترم بیش از ۴ کیلو ✓

نمره: ۱ از ۱

(۱) تجویز پروستاگلاندین E در کودک مبتلا به TGA (TGV) به چه منظوری انجام می شود؟

☐ به منظور بالا بردن فشار خون در اندامها☒ افزایش موقت اختلاط خون ✓☐ بسته شدن کانال شریانی☐ افزایش گردش خون مغز

نمره: ۱ از ۱

(۲) کدام مورد جدی ترین حالت در پاسخ های کودکان به اضطراب جدایی است که نیازمند بررسی های بیشتر است؟

☐ انکار☐ ناامیدی☒ بی اعتنائی ✓☐ اعتراض

نمره: ۱ از ۱

(۳) کدام یک از جملات زیر در مورد مراقبت تسکینی صحیح نمی باشد؟

☒ مراقبت تسکینی بعد از مرگ کودک خاتمه می یابد. ✓

نمره: ۱ از ۱

۳) کدام یک از جملات زیر در مورد مراقبت تسکینی صحیح نمی باشد؟

- ☒ ☒ مراقبت تسکینی بعد از مرگ کودک خاتمه می یابد.
- ☐ مراقبت کامل جسمی و روانی از کودک است.
- ☐ حمایت از خانواده جزئی از مراقبت تسکینی است.
- ☐ همه موارد فوق صحیح می باشد.

نمره: ۱ از ۱

۴) انجام کدام ورزش در بیمار مبتلا به آرتریت ایدیوپاتیک جوانان نامناسب است؟

- ☐ مدپیشن
- ☐ پیاده روی
- ☒ ☒ بسکتبال
- ☐ شنا

نمره: ۱ از ۱

۵) برای والدین کودک مبتلا به کلاب فوت که تحت درمان گچ گیری قرار گرفته است، کدام یک از موارد زیر را آموزش نمی دهید؟

- ☐ بررسی رنگ و سیرکولاسیون انگشتان پای مبتلا
- ☐ ارائه اطلاعات در مورد اصلاح پذیر بودن ناهنجاری
- ☐ آموزش در مورد مراقبت های والدین مبتلایان

نمره: ۱ از ۱

۵) برای والدین کودک مبتلا به کلاب فوت که تحت درمان گچ گیری قرار گرفته است، کدام یک از موارد زیر را آموزش نمی دهید؟

☐ بررسی رنگ و سیرکولاسیون انگشتان پای مبتلا

☐ ارائه اطلاعات در مورد اصلاح پذیر بودن ناهنجاری

☐ آموزش در مورد عوارض درمان و علایم پای لرزان

☒ ماساژ روزانه ساق پا و زیر زانو برای بهبود جریان خون

نمره: ۱ از ۱

۶) در یک کودک مبتلا به تترالوژی فالوت مهمترین عارضه ای که در اثر هایپوکسمی ممکن است ایجاد شود، کدام است؟

☒ پلی سیمی

☐ خستگی هنگام تغذیه

☐ کلابینگ

☐ وزن گیری کمتر

نمره: ۱ از ۱

۷) تفاوت نبض و فشار خون بین اندام های فوقانی و تحتانی مربوط به کدام یک از نقایص قلبی بدو تولد است؟

نمره: ۱ از ۱

۷) تفاوت نبض و فشار خون بین اندام های فوقانی و تحتانی مربوط به کدام یک از نقایص قلبی بدو تولد است؟

TOF ☐

VSD ☐

COA ☒ ✓

PDA ☐

نمره: ۰ از ۱

۸) کدام مورد از آموزش های بعد جراحی برای والدین و کودک مبتلا به دیسپلازی مفصل هیپ نیست؟

انجام حرکات دورانی مفصل ☒ ✗

آموزش شیوه راه رفتن ☐

آموزش حمام اسفنجی ☐

حفظ ابداکشن مفصل ☐

نمره: ۱ از ۱

۹) بهترین پوزیشن در زمان حملات سیانوتیک در کودک شیرخوار چیست؟

supine position ☐

نمره: ۱۰ از ۱

۸) کدام مورد از آموزش های بعد جراحی برای والدین و کودک مبتلا به دیسپلازی مفصل هیپ نیست؟

☒ انجام حرکات دورانی مفصل ❌

☐ آموزش شیوه راه رفتن

☐ آموزش حمام اسفنجی

☐ حفظ ابداکشن مفصل

نمره: ۱۱ از ۱

۹) بهترین پوزیشن در زمان حملات سیانوتیک در کودک شیرخوار چیست؟

☐ supine position

☒ knee chest position ✅

☐ lateral position

☐ prone position

نمره: ۱۱ از ۱

۱۰) در مورد تغذیه شیرخواری که به نارسایی قلبی مبتلا است کدام گزینه مناسب است؟

☒ انجام تغذیه بلافاصله پس از بیداری ✅

☐ افزایش دفعات تغذیه به هر ساعت یکبار

☐ آموزش حمام اسفنجی

☐ حفظ ابداکشن مفصل

نمره: ۱ از ۱

۹) بهترین پوزیشن در زمان حملات سیانوتیک در کودک شیرخوار چیست؟

☐ supine position

☒ knee chest position ✓

☐ lateral position

☐ prone position

نمره: ۱ از ۱

۱۰) در مورد تغذیه شیرخواری که به نارسایی قلبی مبتلا است کدام گزینه مناسب است؟

☒ انجام تغذیه بلافاصله پس از بیداری ✓

☐ افزایش دفعات تغذیه به هر ساعت یکبار

☐ الزام به تغذیه شیرخوار از سینه مادر

☐ انجام تغذیه در پوزیشن خوابیده

Apps TED: Ideas worth sp... Altcoin Buzz - Lates... Nature Binance دانشگاه علوم پزشکی... Elsevier | An... The context of the exam

نمره: ۰ از ۱

شکاف لب در پسر ها و شکاف کام در دختر ها شایع است. ☒ ❌

شکاف کام از طریق مشاهده یا لمس کام تشخیص داده می شود. ☐

شکاف لب در سونوگرافی دوران بارداری قابل تشخیص است. ☐

کودکان حتی بعد از عمل شکاف لب نیاز به گفتار درمانی خواهند داشت ☐

مادر نوزاد مبتلا به شکاف لب از دیدن فرزندش اجتناب می کند پرستار سعی در تشویق مادر برای ملاقات نوزاد دارد این اقدام را به منظور پیشگیری از کدام اختلال زیر انجام می دهد؟ (۲)

نمره: ۰ از ۱

افسردگی مادر به دلیل ناهنجاری نوزاد ☐

اختلال در فرایند دلبستگی بین مادر - نوزاد ☐

اختلال در توانمند شدن مادر ☐

برآورده نشدن نیازهای عاطفی طرفین ☒ ❌

آسپیراسیون کدامیک از موارد زیر باعث پنومونی چربی در کودک می شود؟ (۳)

نمره: ۱ از ۱

نخود و لوبیا ☐

۳) آسپیراسیون کدامیک از موارد زیر باعث پنومونی چربی در کودک می شود؟

نمره: ۱ از ۱

☐ نخود و لوبیا

☐ دکمه لباس

☒ بادام زمینی ✓

☐ هات داگ

۴) به نظر شما کدامیک از ناهنجاری های بدو تولد در نوزاد بیشتر آثار روانی مخربی بر روی والدین دارد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ لب شکری

☐ ناهنجاری قلبی

☐ آترزی مری

☒ ابهام جنسی ✓

۵) کدامیک از مراقبتهای پرستاری از نوزاد مبتلا به اکستروفی مثانه در راستای مراقبت خانواده محور است؟

نمره: ۱ از ۱

☐ کنترل ادرار از نظر رنگ

☐ مراقبت از پوست و جلوگیری از چسبندگی دیابر به مخاط مثانه

☒ بادام زمینی ✓

☐ هات داگ

نمره: ۱ از ۱

۴) به نظر شما کدامیک از ناهنجاری های بدو تولد در نوزاد بیشتر آثار روانی مخربی بر روی والدین دارد؟

☐ لب شکری

☐ ناهنجاری قلبی

☐ آترزی مری

☒ ابهام جنسی ✓

نمره: ۱ از ۱

۵) کدامیک از مراقبتهای پرستاری از نوزاد مبتلا به اکستروفی مثانه در راستای مراقبت خانواده محور است؟

☐ کنترل ادرار از نظر رنگ

☐ مراقبت از پوست و جلوگیری از چسبندگی دیاپر به مخاط مثانه

☒ آموزش والدین در زمینه پذیرش بیماری ✓

☐ کنترل درد نوزاد

نمره: ۰ از ۱

۱) برای نوزاد مبتلا به هیدرونفروز قرار است نمونه ادرار جهت کشت از طریق کاتتر تهیه و ارسال کنید. اولین اقدام شما بعد از قرار دادن نوزاد روی وارمر چیست؟

☒ روشن کردن دستگاه وارمر برای پیشگیری از هیپوترمی 

☐ هند راب دستها برای پیشگیری از عفونت بیمارستانی

☐ کشیدن پاراوان برای رعایت کردن حریم شخصی نوزاد

☐ توضیح دادن پروسیجر به مادر برای کاهش استرس

نمره: ۰ از ۱

۲) مادر نوزاد مبتلا به مننگومیلوسل گریه می کند و در پاسخ به سؤال پرستار علت گریه خود را نگرانی از عدم توانایی خود برای تغذیه نوزاد بیان می کند. پرستار چگونه باید نقش حمایتی خود را ایفا کند؟

☐ به مادر بگوید تغذیه این نوزاد با نوزادان دیگر فرقی ندارد.

☐ به مادر آموزش دهد که نوزاد را با شیشه تغذیه نماید.

☒ به مادر بگوید که می تواند او را در وضعیت کانگورو تغذیه نماید 

☐ به مادر بگوید هر وقت خواستی نوزاد را تغذیه کنی مرا صدا بزن

نمره: ۱ از ۱

۳) نوزاد مبتلا به هیدروسفالی در بخش بستری می باشد، مادر نوزاد بیان می کند که نوزاد از صبح برای تغذیه بیدار نشده است. اقدام فوری پرستار چیست؟

☒ کنترل مخزن شنت از نظر کارکرد 

نمره: ۱ از ۱

۳) نوزاد مبتلا به هیدروسفالی در بخش بستری می باشد، مادر نوزاد بیان می کند که نوزاد از صبح برای تغذیه بیدار نشده است. اقدام فوری پرستار چیست؟

☒ ☒ کنترل مخزن شنت از نظر کارکرد

☐ کنترل قند خون نوزاد

☐ اطلاع فوری به پزشک

☐ تغذیه نوزاد از طریق NGT

نمره: ۱ از ۱

۴) پرستار ایزوله معکوس را درباره کدامیک از کودکان زیر رعایت می کند؟

☐ کودک مبتلا به تومور ویلمز

☒ ☒ کودک مبتلا به سندرم نفروتیک

☐ بعد از عمل جراحی کودک مبتلا به مننژیومیلوسل

☐ بعد از عمل جراحی کودک مبتلا به هیدروسفالی

نمره: ۱ از ۱

۵) “اختلال در تمامیت پوستی ” جزو تشخیص های پرستاری کدامیک از بیماری های زیر در کودکان نیست؟

☒ ☒ میکروسفالی

☐ سندرم نفروتیک

☐ هیدروسفالی

کنترل قند خون نوزاد ☐

اطلاع فوری به پزشک ☐

تغذیه نوزاد از طریق NGT ☐

نمره: ۱ از ۱

۴) پرستار ایزوله معکوس را درباره کدامیک از کودکان زیر رعایت می کند؟

کودک مبتلا به تومور ویلمز ☐

کودک مبتلا به سندرم نفروتیک ☒ ✓

بعد از عمل جراحی کودک مبتلا به مننژیومیلوسل ☐

بعد از عمل جراحی کودک مبتلا به هیدروسفالی ☐

نمره: ۱ از ۱

۵) "اختلال در تمامیت پوستی" جزو تشخیص های پرستاری کدامیک از بیماری های زیر در کودکان نیست؟

میکروسفالی ☒ ✓

سندرم نفروتیک ☐

هیدروسفالی ☐

اکستروفی مثانه ☐

۱) اولین اقدام در حملات هایپرسیانوتیک چیست؟

نمره: ۱ از ۱

☒  پوزیشن زانوسینه ای یا سجده

☐ اکسیژن رسانی

☐ تجویز مورفین

☐ تجویز مایعات

۲) کودکی با علائم تب، التهاب دوطرفه ملتحمه و زبان توت فرنگی در بخش بستری است. کدام گزینه از مهمترین نکات آموزشی به والدین کودک است؟

نمره: ۱ از ۱

☐ تغذیه با مایعات صاف شده

☒  انجام بررسی های دوره ای قلب

☐ توزین روزانه

☐ مراقبت از پوست

۳) علت چماقی شدن انگشتان (کلابینگ) در کودک مبتلا به ناهنجاری مادرزادی قلبی چیست؟

نمره: ۱ از ۱

☐ پلی سایتمی

نمره: ۱ از ۱

۳ علت چماقی شدن انگشتان (کلابینگ) در کودک مبتلا به ناهنجاری مادرزادی قلبی چیست؟

☐ پلی سایتمی

☒ هیپوکسمی ✓

☐ احتباس خون در اندام ها

☐ همه موارد

نمره: ۱ از ۱

۴ مهمترین هدف در مراقبت از این کودک مبتلا به فیبروز کیستیک دستیابی به چیست؟

☒ پاکسازی مؤثر راههای هوایی ✓

☐ اصلاح الکترولیت ها

☐ تامین رشد و تکامل

☐ کنترل مشکلات گوارشی

نمره: ۱ از ۱

۵ انتخاب کنید که کدام گزینه از عوارض بیماری کیستیک فیبروزیس است.

☐ ادم ریوی

☒ دیابت ✓

☐ احتباس ادراری

هیپوکسمی ☒ ✓

احتباس خون در اندام ها ☐

همه موارد ☐

نمره: ۱ از ۱

۴) مهمترین هدف در مراقبت از این کودک مبتلا به فیبروز کیستیک دستیابی به چیست؟

پاکسازی مؤثر راههای هوایی ☒ ✓

اصلاح الکترولیت ها ☐

تامین رشد و تکامل ☐

کنترل مشکلات گوارشی ☐

نمره: ۱ از ۱

۵) انتخاب کنید که کدام گزینه از عوارض بیماری کیستیک فیبروزیس است.

ادم ریوی ☐

دیابت ☒ ✓

احتباس ادراری ☐

شوک ☐

10°C. Mostly cloud

نمره: ۱ از ۱

۱) کدامیک از کودکان زیر را به عنوان تاخیر تکاملی ارجاع می دهید؟

☐ کودک شیرخواری که هنگام تغذیه با مادر تماس چشمی برقرار نمی کند

☐ کودک شیرخواری که رفلکسهایش کاهش یافته است

☐ کودک شیرخواری که نسبت به محرکهای محیطی بی تفاوت است

☒ ☒ کودک هشت ماهه ای که هنوز گردن گیری ندارد

نمره: ۱ از ۱

۲) منظور از Task Analyzing در آموزش کودک مبتلا به اختلال شناختی چیست؟

☒ ☒ تقسیم هر یک از وظایف به بخش های متعدد

☐ تکرار و بازگویی مکرر

☐ تقویت مثبت توانایی های کودک و چشم پوشی از رفتار نامطلوب

☐ تاکید بر یادگیری مهارت به جای اصول تئوری

نمره: ۱ از ۱

۳) کدامیک از نشانه های زیر جزو علایم اولیه فلج مغزی است؟

☐ اپیستو تونوس

☒ ☒ ثبوت رفلکسهای دوره نوزادی

نمره: ۱ از ۱

۳) کدامیک از نشانه های زیر جزو علائم اولیه فلج مغزی است؟

☐ اپیستو تونوس

☒ ثبوت رفلکسهای دوره نوزادی

☐ سینه خیز رفتن یکطرفه

☐ fisting

نمره: ۱ از ۱

۴) کودک چهار ساله ای با تشخیص تشنج ناشی از تب در بخش بستری است. کدام یک از اقدامات پرستاری زیر جزو اقدامات پیشگیری محسوب نمی شود؟

☐ قرار دادن کودک به پهلو جهت تسریع خروج ترشحات در حین تشنج

☐ بالا بردن میله های کنار تخت

☒ کشیدن دیازپام و قرار دادن بر بالا سر بیمار

☐ آموزش به مادر در زمینه مدیریت تب کودک

نمره: ۱ از ۱

۵) کودکان مبتلا به سندرم داون پل بینی کوتاه و پهن دارند . مشکلات ناشی از این اختلال چیست؟

الف- اوتیت میانی مکرر

ب- اختلال در تخلیه ترشحات بینی

ج- ظاهر فیزیکی نامطلوب

د- باز مانده بودن دهان

☒ الف و ب

نمره: ۱ از ۱

۱) هدف از درمان دارویی در کودکان مبتلا به آسم چیست؟

☒ کاستن التهاب و دفع ترشحات

☐ انقباض نایژه ها و کاستن ترشحات

☐ انقباض راه هوایی و پیشگیری از عفونت

☐ تسکین سرفه و کاهش تب

نمره: ۱ از ۱

۲) بهترین بخور در سندرم کroup کدام است؟

☐ گرم و خشک

☐ گرم و مرطوب

☒ سرد و مرطوب

☐ سرد و خشک

نمره: ۱ از ۱

۳) کدام اقدام در شیرخوار مبتلا به پنومونی بستری در بخش که دچار دیسترس تنفسی شدید شده است، در اولویت نمی باشد؟

☐ اطمینان از برقراری جریان اکسیژن

☒ انجام فیزیوتراپی قفسه سینه

نمره: ۱ از ۱

۳) کدام اقدام در شیرخوار مبتلا به پنومونی بستری در بخش که دچار دیسترس تنفسی شدید شده است، در اولویت نمی باشد؟

☐ اطمینان از برقراری جریان اکسیژن

☒ انجام فیزیوتراپی قفسه سینه

☐ NPO نگه داشتن شیرخوار

☐ مشاوره با پزشک جهت بررسی VBG

نمره: ۱ از ۱

۴) کدام نوع از انواع کروپ جز اورژانسه‌ای تنفسی محسوب میشود؟

☐ لارنژیت

☒ اپیگلوتیت

☐ لارنگوتراکئوبرونشیت

☐ تراکئیت

نمره: ۱ از ۱

۵) کودکی دچار آپنه بوده و تعداد ضربان قلب او بالای ۶۰ ضربه در دقیقه است. اقدام مناسب کدام است؟

☐ شروع تنفس و ماساژ به مدت ۲ دقیقه

☐ چک وضعیت تنفسی و قلبی به مدت ۱۰ ثانیه

☒ تنفس با فشار مثبت به تعداد ۲۰ تنفس در دقیقه

☐ ماساژ قلبی با سرعت ۱۰۰ ضربه در دقیقه

دانشگاه علوم پزشکی ... Elsevier | An Inform... The Lancet | The be...

اپیگلوتیت ☒

لارنگوتراکتوبرونشیت ☐

تراکتیت ☐

نمره: ۱ از ۱

۵) کودکی دچار آپنه بوده و تعداد ضربان قلب او بالای ۶۰ ضربه در دقیقه است. اقدام مناسب کدام است؟

شروع تنفس و ماساژ به مدت ۲ دقیقه ☐

چک وضعیت تنفسی و قلبی به مدت ۱۰ ثانیه ☐

تنفس با فشار مثبت به تعداد ۲۰ تنفس در دقیقه ☒

ماساژ قلبی با سرعت ۱۰۰ ضربه در دقیقه ☐

نمره: ۱ از ۱

۶) در مراقبت از کودک مبتلا به حمله آسم، اولویت انجام با کدام اقدام است؟

برقراری خط وریدی ☐

کاهش اضطراب کودک ☐

شروع اکسیژن درمانی ☒

محدود کردن فعالیت ☐

32. کدام عبارت در مورد تکامل اجتماعی در این کودکان صحیح تر است؟

☒ الف) دوستی با اعضای گروه در هر شرایط برای آنها مهمترین هدف است.

☐ ب) کودکان در این سن علاقه ویژه ای به مباحثه و متقاعد کردن دارند.

☐ ج) ارزش های خود را با ارزش های دوستان مطابقت می دهند.

☐ د) کودک علاقه ای به تعاملات اجتماعی ندارد.

33. کودک 5 ساله در کدام مرحله از مراحل

نظریه فرسودگی قرار دارد؟

مرور پاسخ ها

صفحه بعدی >

صفحه : 4 از 4 / تعداد سوال این صفحه: 4

اتمام آزمون

سوالات تشریحی

۱۸. منظور از سندرم "ایزن منجر" چیست؟ (۰/۵)
۱۹. مقیاس FLACC چیست و چه معیارهای در آن مد نظر می باشد؟ (۱)
۲۰. چرا جای گیری مایعات در دهی دراتاسیون هیپوتونیک با سرعت کم می باشد؟ (۰/۵)
۲۱. علت ترشح ADH در طی دهی دراتاسیون را توضیح دهید؟ (۰/۵)
۲۲. از عوارض خطرناک گلوپروکولونفریت دو مورد را ذکر کنید؟ (۰/۵)
۲۳. تشخیص قطعی بی حاری سلیاک چیست و جدی ترین عارضه بی حاری چه می باشد؟ (۰/۵)
۲۴. تستهای مورد نیاز جهت اندازه گیری عملکرد پلاکتها چیست؟ (۰/۵)
۲۵. علت کاهش توان حرکتی مفاصل در هموفیلی چیست؟ (۰/۵)
۲۶. از علائم بی حاری کاوازاکی به سه مورد اشاره کنید؟ (۰/۵)
۲۷. به چه علت در بی حاران مبتلا به لوسمی جهت کاهش تب اسپرین داده نمی شود؟ (۰/۵)
۲۸. آسترنوگوزیس چیست و از تستهای مورد بررسی در چه بی حاری می باشد؟ (۰/۵)
۲۹. از مواردی که باعث تشنج در کودکان می شود سه مورد را ذکر کنید؟ (۰/۵)
۳۰. محل شایع آسیب راسیون از کدام برونش می باشد و چرا؟ (۰/۵)
۳۱. از علائم گوارشی فیبروز کیستیک دو مورد را ذکر کنید؟ (۰/۵)

پاسخنامه سوالات تئوری

شماره	الف	ب	ج	د	شماره	الف	ب	ج	د
۱					۶				
۲					۷				
۳					۸				
۴					۹				
۵					۱۰				
					۱۱				
					۱۲				
					۱۳				
					۱۴				
					۱۵				

۱۸ - باعث سمیت آب می شود.

۱۹ - به دلیل افزایش (مصرف) سرم

۲۰ - بیرونی از رژیم - اسهال و کم آبی دائمی

۲۱ - BT (زمان خونریزی)، سرعت خونریزی

۲۲ - چهار مورد (خونریزی داخل منحنی) مخصوص زائود آریخ

۲۳ - حاد: تب بالا ۵ روز - تحت حاد: آرتری - ذرات: ESR بالا

۲۴ - به دلیل آسیب خونریزی

۲۵ - تب بالا، سیسین، زائیدان سنت و مکلن

۲۶ - افزایش غلظت مغز و عدم تمایز به دوازدهم به استخوان نوبه
افزایش غلظت آنتروم یا کراس به سود تقدر و سود

۷- در معاینه فیزیکی شیرخوار مبتلا به انوارپناسیون نوده ای در ناحیه اپی گاستر لمس شده و RI.Q خالی به نظر می رسد. بخش در

- هم رفته در کدام ناحیه می باشد؟
الف- کولون بالارونده ☒ ب- کولون عرضی ☒ ج- کولون پایین رونده ☐ د- رکتوم ☐

۸- احتمال تولد یک فرزند دختر هموفیلی از پدر مبتلا و مادر حامل چند درصد است؟

- الف- ۵۰٪ ☐ ب- ۷۵٪ ☐ ج- ۲۵٪ ☒ د- ۱۰۰٪ ☐

۹- چنانچه بهره هوشی کودک عقب مانده بین ۷۵-۵۱ باشد با کدام یک از موارد زیر می تواند مناسبت داشته باشد؟

- الف- آموزش پذیر ☐ ب- وابستگی به دیگران ☐ ج- تربیت پذیر ☐ د- می تواند تا اندازه ای مشاغل فکری داشته باشد ☐

۱۰- کدامیک از موارد زیر تظاهر همگانی در انواع CP می باشد؟

- الف- عقب ماندگی ذهنی ☐ ب- نقص شنوایی ☐ ج- تاخیر در تکامل حرکتی ☒ د- نایبایی ☐

۱۱- پرستار به والدین کودک مبتلا به کرتینیسم که داروی sodium levothyroxine مصرف می کند آموزش می دهد که در صورت

بروز کدام یک از علائم زیر دارو را به کودک نداده و وضعیت را به پزشک اطلاع دهد؟

- الف- افزایش وزن ☒ ب- تاکیکاردی ☒ ج- آبریزش از دهان ☐ د- کاهش BP ☐

۱۲- شیرخواری ۱۰ ماهه با وزن ۵/۵kg مبتلا به FTT می باشد. سابقه استفراغ مکرر و آهسته به دنبال آن داشته و ریه ها ویزینگ

منشر دارند. سابقه بستری در بیمارستان به علت عفونت ریه داشته است. بیشترین تشخیص احتمالی چیست؟

- الف- جسم خارجی ریه ☐ ب- آسم برونکیال ☐ ج- ریفلاکس گاستروازوفازیا ☒ د- فیستول تراکتوآزوفازیا ☐

۱۳- کودک سه ماهه ای با استفراغ صفراوی و دیستانسیون شکم مراجعه کرده است. همه تشخیصهای زیر مطرح هستند به جز:

- الف- آترزی ییلور ☒ ب- آترزی دنودنوم ☐ ج- انسداد پانکراس ☐ د- آترزی زژنوم و ایلنوم ☐

۱۴- کودکی ۳ ساله که ناگهانی ساعت یک بعد از نیمه شب دچار گرفتگی صدا، حالت خفگی و استریدور شدید شده است.

سراسیمه به درمانگاه می آورند و ذکر می کنند که در طی راه حال وی بهتر شده است، کدام یک از موارد زیر بیشتر مطرح است؟

- الف- LBT ☐ ب- اپی گلویتیت حاد ☐ ج- کروپ ☒ د- جسم خارجی ☐

۱. کدام یک از علامت زیر بارزترین علامت هیپروسمالی در دوران شیرخوارگی است؟
 الف) برآمدگی ملاح (ب) اتساع وریدهای سر (ج) بزرگی سر (د) علامت مک وین
۲. پرستار در هنگام آموزش به والدین علت استفاده از آتل برای درمان DDH را این گونه بیان می کند:
 الف) محدود کردن مفصل هیپ (ب) دور کردن مفصل هیپ (ج) نزدیکی کردن محور هیپ به بدن (د) ایجاد کش در هیپ
۳. کدام یک از روش های زیر در تشخیص GER قطعی بی شتری دارند؟
 الف) آندوسکوپی (ب) مانی تورینگ PH مری (ج) بلع باریوم (د) کسب تاری پنجه
۴. هدف از تغذیه سوند گاستروستومی در بی حاران مبتلا به آنرزی مری بیش از عمل جراحی کدام است؟
 الف) برقراری تنفس (ب) کاهش نفخ شکم (ج) برقراری شستشوی معده (د) کاهش ری فلاکس احتمالی
۵. جهت تغذیه نوزاد در مرحله حاد انترکولیت نکروزان چه اقدامی انجام می شود؟
 الف) تغذیه از طریق سوند معده (ب) تغذیه با شیر مادر (ج) تغذیه با آب و قند (د) کودک NPO می شود.
۶. علت سی انوز در تترالوژی فالوت کدام است؟
 الف) تنگی شریان انورت (ب) تنگی دریچه میترال (ج) تنگی شریان ریوی (د) خونرسانی به انورت از ورید اجوف
۷. هدف از درمان لوسمی کدام است؟
 الف) ایجاد خاموشی و تداوم آن (ب) برطرف کردن خونریزی و تداوم آن (ج) بالا بردن مقاومت در برابر عفونت (د) به چه دلیل در مراقبت پرستاری پس از جراحی قلب در کودکان نباید از ساکشن عمیق استفاده کرد؟
- الف) ایجاد الکالوز تنفسی
 ج) ایجاد زخم در مخاط بونشی
 د) موارد زیر جزء علائم زودرس غی راختصاصی سیمی س می باشد به جز:
 الف) هیپوترمی، عدم اتساع گازهای خونی
 ج) روی دادهای ناگهانی آینه
 د) اولین تغذیه رات ناشی از دهی دراتاسیون کدام مورد است؟
۱۰. الف) تبض (ب) فشار خون (ج) ادرار (د) مخاط بونشی
۱۱. مصرف لی دوکائین هیپروکلراید در CPR به چه منظور است؟
 الف) قلبی ای کننده (ب) افزودن بازده قلبی (ج) آنتی کلی نرژیک (د) ضداریتیم
۱۲. نحوه ارتباط سطح بتاسیم و دی گوکسین در بی حاران قلبی چگونه است؟
 الف) کاهش سطح بتاسیم سب افزایش اثر دی گوکسین می شود. (ب) ارتباط بتاسیم با دی گوکسین وابسته به ملیحات خارج سلولی است. (ج) کاهش سطح بتاسیم سبب کاهش اثر دی گوکسین می شود. (د) ارتباطی بین این دو وجود ندارد و فقط بازده ادرار مهم است.
۱۳. بایه تشخیص HPS در شیر خواران کدامیک از موارد زیر است؟
 الف) کم آبی و سستی شیرخوار (ب) الکالوز متابولیک هیپوکلرمی (ج) اتلاف وزن به صورت تحلیل جریبی (د) وجود توده زی تونی در سمت راست خط میانی شکم
۱۴. در کودک مبتلا به تالاسمی مصرف کدامیک از موارد زیر منع می شود؟
 الف) کوکا و چای (ب) اسیداسکوربیک (ج) Vit E (د) اسید فولیک
۱۵. چنانچه بهره هوشی کودک عقب مانده بین ۷۵-۵۱ باشد با کدام یک از موارد زیر می تواند مناسبت داشته باشد؟
 الف) آموزش پذیری (ب) وابستگی به دیگران

۱- در کودک مبتلا به club foot جهت حفظ وضعیت مناسب در پا از آتل دینس برای استفاده می شود. کدام مورد در استفاده از این وسیله نادرست می باشد؟

- الف- در استفاده از آن داشتن جوراب لازم است
ب- طول مدت استفاده از آن به والدین آموزش داده شود
ج- به عنوان اولین و مناسبترین درمان club foot می باشد.
د- آموزش به والدین که پاها را از نظر تحریک کنترل کنند.

۲- پرستار در بررسی مداوم از کودک مبتلا به اوتیسم میانی پس از دوره درمان از والدین در مورد نحوه تکلم کودک سوال می کند. والدین علت این بررسی را می پرسند، پرستار پاسخ می دهد:

- الف- پس از دوره کامل درمان بیماریها، همه سیستمهای کودک مورد بررسی قرار می گیرند و جای نگرانی نیست.
ب- ناشنوایی موقت ناشی از اوتیسم میانی می تواند در رشد زبان و مهارتهای کلامی تاثیر بگذارد.
ج- یکی از ملاکهای درمان کامل کودک نحوه بیان و اظهارات کودک می باشد.
د- عوارض داروهایی که در طول مدت درمان استفاده شده را بررسی می کند.

۳- پایه تشخیص HPS در شیر خواران کدامیک از موارد زیر است؟

- الف- کم آبی و سستی شیرخوار
ب- آلکالوز متابولیک هیپوکلرمی
ج- انزال و زکته به صورت تحلیل جری
د- وجود توده زیتونی در سمت راست خط میانی شکم

۴- در صورت وجود آنرژی مری بدون وجود فیستول از معده به نای پوزیشن مناسب کودک کدام یک از حالتها زیر است؟

- الف- سر به پایین
ب- سر در وضعیت
ج- سر در وضعیت خشی
د- سر به بالا

۵- یکی از تشخیصهای پرستاری در کودک مبتلا به cleft lip اضطراب والدین در ارتباط با ظاهر نهایی کودک می باشد. کدام یک از تدابیر پرستاری زیر جهت رفع این مشکل مناسب است؟

- الف- توجه دادن والدین به خصایص طبیعی و تواناییهای کودک
ب- کمک با سازش با عیب کودک
ج- نشان دادن تصاویر قبل و پس از عمل شیر خوار مشابه
د- راهنمایی جهت گفتگو و مشاوره با جراح

۶- در کودک مبتلا به تالاسمی مصرف کدامیک از موارد زیر منع می شود؟

- الف- کوکا و چای
ب- اسیداسکوربیک
ج- Vit E
د- اسید فولیک

۱۱- پرستار در طرح مراقبت از کودک مبتلا به مننژیت باکتریال کدام مورد زیر را باید در نظر بگیرد؟

الف) تحریکات محیطی را در حداقل نگه دارد.

ب) از دادن داروهای ضد درد و موثر در هوشیاری خودداری کند.

ج) دور سر را جهت بررسی عوارض در حال بروز اندازه گیری کند.

د) کودک را وادار کند که حداقل هر ۲ ساعت سر را از یک سمت به سمت دیگر حرکت دهد.

۱۲- کودکی به نارگی پس از جراحی با گچ اسبابکای لگن برگشته است. کدام یک از مداخلات پرستاری ذیل در اولویت قرار دارد؟

الف) بالا بردن سر تحت ☒ ب) کنترل جریان خون اندامهای تحتانی ☒ ج) برگرداندن سر به سمت راست ☐ د) دادن جرعهای آب

۱۳- در مراقبت قبل از عمل کودک مبتلا به میلومنگوسل کدام یک از موارد ذیل مداخله مهم پرستاری محسوب می شود؟

☒ الف) فرار دادن کودک به یک پهلوی جهت کاهش فشار روی طناب نخاعی

ب) استفاده از گوما جهت سهولت در خشکی و سفت شدن سای

ج) تمییز و خشک نگه داشتن پوست برای پیشگیری از تحریک ناشی از مدفوع اسهالی

د) اندازه گیری دور سر و بررسی ملاح ها از نظر علائمی که می تواند نشان دهنده بروز هیدروسفالی باشد.

۱۴- بیشترین علت متداول فلج مغزی کدام یک از موارد زیر است؟

الف) آسیب های زمان تولد ☐ ب) بیماریهای نوزادی ☐ ج) آسیب مغزی ☒ د) عبوب مغزی قبل از تولد ☒

۱۵- با تشخیص لرسمی حاد لغومینتی (ALL) پرستار وجود کدام یک از موارد زیر را غیرعادی می داند؟

الف) خستگی زیاد و رنگ پریدگی

ب) کوفتگی های مکرر و پتشی

ج) بزرگی غدد لنفاوی، ملحال و کد

☒ د) زردی قابل توجه و ادم جنرالیزه

۱۶- در مشاوره تغذیه ای والدین نوزادی که مبتلا به PKU است نیاز به کمک و حمایت برای رعایت رژیم غذایی دارند. یکی از سوالاتی که اغلب می پرسند این است که چه مدتی کودک من باید تحت رژیم باشد. پاسخ مناسب کدام مورد ذیل است؟

الف) هیچ کس نمی داند.

ب) معمولاً اگر کودک به مدت یک سال خوب باشد غذای عادی به تدریج شروع می شود.

☒ ج) متأسفانه این مساله مادام العمر است و رژیم غذایی باید همیشه رعایت شود.

د) تحقیقات تا کون نشان داده است که کودک نیاز داد تا نوجوانی و حتی پس از آن مراعات کند.

۱۷- کودکی با شکاف لب و کام یک طرفه متولد شده است، تغذیه وی احتمالاً:

الف) محدود به مایعات و ریبدی خواهد بود

ب) از طریق سرستاک نرم با سوراخ بزرگ خواهد بود

ج) با سرنگ دارای نوک لاستیکی با قطره چکان خواهد بود. ☒ د) به علت مسائل نفسی سخت است ☒

۱۸- دیسپلازی تکاملی هیپ اغلب توسط پرستار در اتاق نوزادان تشخیص داده می شود. در بررسی تشخیص شیرخوار کدام مورد زیر را نشان می دهد؟

الف) ضعیف شدن رفلکس رقص

☒ ب) عدم تفارن چین های سرین ☒

ج) محدودیت در نزدیک کردن ساق

د) کوتاه شدن ساق در سمت غیر مبتلا (سالم)

۱۹- کودک ۴ ساله ای جهت بازی شنت بطنی-صفاتی بتری شده است. علامت شنت عفونی که پرستار باید به آن توجه کند شامل:

الف) لنارژی ☐ ب) سردرد ☐ ج) سفتی گردن ☒ د) کاهش نبض ☒

۱- در عمل بلاتوک توریک (Blalock tassing) کدام آناتوموز صورت می‌گیرد؟

الف) بین شریان پولهونر و آنورت بالارونده
ب) بین پولهونر و ورید اجوف تحتانی

ج) بین ورید اجوف فوقانی و تحتانی
د) بین شریان تحت ترفوای و ریوی

۲- مهمترین اقدام پرستاری در ارتباط با هیپوتیروئیدیسم مادرزادی کدام مورد ذیل است؟

الف) تشخیص زودتر اختلال
ب) ایجاد سهولت در پدیده وابستگی والدین شیرخوار

ج) ارجاع از نظر عقب ماندگی ذهنی
د) کمک کردن به والدین جهت سازش با چشم انداز آتی کودک

۳- بلافاصله بعد از انعام حمله صرعی در چه وضعیتی باید کودک را قرار داد؟

الف) نشسته
ب) طاق باز

ج) به یک پهلو
د) برمر

۴- کدام مورد زیر مفهوم مرگ را از دیدگاه کودک ۴ ساله توصیف می‌کند؟

الف) مرگ پدیده موقت است
ب) مرگ دایمی است

ج) مرگ در اشکال مختلف متفاوت است
د) مرگ در یک سنی اجباری است

۵- کدام یک از موارد ذیل از تظاهرات بالینی افزایش فشار درون جمجمه‌ای در شیرخواران می‌باشد؟

الف) تحریک پذیری
ب) فوتوفوبی

ج) وجود نبض در ملاح قدیمی
د) استفراغ و اسهال

۶- کودک نوپا مبتلا به نارسایی حاد کلیوی به طور ثانویه به علت دهیدراتاسیون شدید در بیمارستان بستری شده است. پرستار برای کدام یک

از عوارض احتمالی زیر باید کودک را بررسی کند؟

الف) کاهش فشار خون
ب) کاهش پتاسیم خون

ج) افزایش سدیم خون
د) مسمومیت با آب

۷- شیرخواری با ژنیتال مبهم متولد شده است. آزمایشاتی جهت مشخص کردن جنس انجام می‌شود والدین به پرستار می‌گویند که خانواده و

دوستان دلیل این مساله را مطرح می‌سازند. مداخله پرستار کدام مورد زیر می‌باشد؟

الف) توضیح اختلال در این صورت والدین می‌توانند به دیگران توضیح دهد.

ب) کمک به والدین جهت درک این که هیچ کس چگونگی پیدایش آن را نمی‌داند.

ج) پیشنهاد به والدین که از خانواده و دوستان دوری نمایند تا جنسیت مشخص شود.

د) تشویق والدین به این که در مدتی که آزمایشات انجام می‌شود نگران نباشند.

۸- کدام مورد زیر اقدام پرستاری در توجه از شیرخوار مشکوک به آنترکولیت نکروزان است؟

الف) افزودن تغذیه بر حسب تحمل
ب) کنترل حرارت مقعد هر ۲ ساعت

ج) قرار دادن شیرخوار روی شکم
د) کنترل دقیق علائم حیاتی به علاوه فشار خون

۹- هدف اولیه در مراقبت از کودک با عقب ماندگی ذهنی شامل:

الف) تشویق به بازی
ب) ارتقای مناسب تکامل

ج) کمک به خانواده برای سازش با مراقبت آتی
د) توسعه مهارتهای شغلی

۱۰- امر مهمی است که کودک با التهاب استرپتوکوکی حاد حلق (فارانژیت) با آنتی‌بیوتیک تحت درمان قرار گیرد زیرا از یکی از موارد زیر

پیشگیری می‌کند؟

الف) اوتیت میانی
ب) دیابت بی مزه

ج) سندرم نفروتیک
د) تب روماتیسمی حاد

- ۱- هیپروستاتی (استاتی و غیر استاتی) را با ذکر مثال برای هر کدام توضیح دهید؟ (۱)
- ۲- چهار مورد از علائم مورد بررسی در کودکان مبتلا به CDH را با توضیح مختصر هر علامت بنویسید؟ (۱)
- ۳- اختلالات درماتی در کودکان مبتلا به کریپتورکیسزم را بنویسید؟ (۰/۵)
- ۴- اختلالات حمایتی از کودکان مبتلا به فتق دیافراگمی قبل از عمل چیست؟ (۰/۷۵)
- ۵- علائم کودکان مبتلا به PKU را ذکر کنید؟ (۰/۵)
- ۶- مراحل اختلالات حمایتی را در کودکان توضیح دهید؟ (۰/۷۵)
- ۷- کدام یک از انواع دهیدراتاسیون (بر اساس غلظت سدیم) خطرناکتر است؟ چرا؟ (۰/۵)

با آرزوی موفقیت

- کسیژن: Allis sign - Galleazzi sign - با دست در رفته وقتی خم شده و زانوها کنار هم است، گواهی ترازی می دهیم
- Ostolani Nanciver - فک روی تروکانتر بزرگ و باها از هم دور می افتند و سر خم می شود داخل حلقه استابولوم می افتد
- Barlow test - فک از قسمت داخلی زانو و باغک می افتد یا باها بهم نزدیک می شوند و سر خم می شود از حلقه استابولوم خارج می شود در محل اولیج در شکم قرار می گیرد.
- از طرف دیگر در زانو چپ می نشینی زانو را تکان داد.
- ۳- درم: هورمون LH (به صورت ایسی نی میزد و درد دارد) و HCG تزریقی - جراحی (اگر کیستیک می باشد).
- ۴- نیاز به امپا - بی نظرس خواب است به دیگلا - داون اکیژن - لوک نزاری داخل ترانک در صورت تکریم وضعیت تنفسی
- ↓ تمرینات جهت نیاز به اکیژن
- ۵- استغراق - نیازی به در رفتن - دل درد - کوبه مداوم - تشنگی بی مری - هیپر تونی - درکات تکرار می شود.
- عدم هدایت به سمت بخار و زانو
- ۷- جبهه تارکین زانو ظاهراً جامع خیم تنگی و بدون دردی گاهی هم داخل زانو می افتد و غنای دهند پس تشخیص به توفیق می رسد

۱۱) مهمترین مراقبت پرستاری بعد از شکاف کام چیست؟

نمره: ۰ از ۱

آموزش والدین ☒



کنترل تنفس ☐

حفاظت محل عمل ☐

مایع درمانی ☐

۱۲) در نوزادی که تحت عمل جراحی شکاف لب قرار گرفته است قرار دادن نوزاد در کدام وضعیت صحیح نیست؟

نمره: ۱ از ۱

خوابیده به پشت ☐

خوابیده به شکم ☒



خوابیده به پهلو راست ☐

خوابیده به پهلو چپ ☐

۱۹) کدامیک از مراقبت های پرستاری زیر مربوط به کودک مبتلا به اکستروفی مثانه نیست؟

نمره: ۱ از ۱

استفاده از گاز استریل خشک برای محافظت از مخاط مثانه



استفاده از پماد اکسیدوزنگ برای محافظت پوست اطراف



تنظیم مایعات بدن



آموزش والدین



۲۰) بیان کدام عبارت زیر در والدینی که نوزاد دارای ناهنجاری دارند ممنوع است؟

نمره: ۱ از ۱

می توانست بدتر از این باشد



شما توانایی مراقبت از این نوزاد را دارید



برای مراقبت از این نوزاد شما باید قوی باشید



روزانه صدها نوزاد با ناهنجاری متولد می شوند



۷) ابتلای کدام کودک به کم خونی فقر آهن در یکسالگی، محتمل است؟

نمره: ۱ از ۱

تولد نارس، تغذیه با شیر مادر و اهدایی،
تغذیه کمکی از ۴ ماهگی، دریافت مکمل
آهن از دو ماهگی ☐

تولد فول ترم، تغذیه انحصاری شیر مادر تا ۹
ماهگی، مصرف زیاد چای شیرین، مکمل
آهن فقط در ماه ششم ☐

تولد فول ترم، مصرف کننده شیر گاو تا
یکسالگی، شروع تغذیه کمکی و قطره آهن
هر دو از ۱۰ ماهگی ☐

☒ ب و ج



۸) کدام تشخیص پرستاری در نمی باشد؟

نمره: ۱ از ۱

خطر عفونت محل جراحی ☐

خطر شوک ☒



خطر عدم تعادل حجم مایع ☐

خطر آسپیراسیون ☐



(۱) کدام مورد، مربوط به پیامد دردهای مکرر و تسکین نیافته شیرخواران می باشد؟

نمره: ۱ از ۱

هیپرگلیسمی ☒



خونریزی درون شکمی ☐

ذخیره چربی و کربوهیدرات ☐

آستانه بالای درد ☐

(۲) کدام ابزار زیر بیشتر برای تعیین محل درد کودکان کاربرد دارد؟

نمره: ۱ از ۱

Faces ☐

Oucher ☐

APPT ☒



VAS ☐



۵) کدام گزینه در مورد تنگی هیپرتروفیک پیلور صحیح می باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ زائده زیتونی در قسمت اپی گاستر

☐ پرستالتیس قابل مشاهده

☐ زائده سوسیسی در قسمت فوقانی شکم

☒ الف و ب



۶) کدام گزینه در خصوص نوع نمونه برای تست گاتری و نام بیماری مربوطه صحیح می باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☒ آزمایش خون - فنیل کتونوری



☐ آزمایش ادرار - گالاکتوزمی

☐ آزمایش خون - گالاکتوزومی

☐ آزمایش خون - هیپو تیروئیدیسم مادرزادی



۱۵) روش تغذیه نوزاد با شکاف لب خفیف کدام است؟

نمره: ۱ از ۱

☐ دادن شیر با سوند مخصوص تغذیه نوزاد

☐ تغذیه وریدی از راه سرم

☐ تغذیه از طریق گاستروستومی

☒ تغذیه از طریق سینه مادر 

۱۶) در گزارش کردن عیب نوزاد حین تولد به والدین کدام مورد زیر صحیح است.

نمره: ۱ از ۱

☐ تاکید کردن به بی اهمیت بودن عیب

☒ تاکید بیشتر بروی قسمت های سالم بدن 

☐ تاکید بر قابل درمان بودن عیب

☐ نشان دادن عیب به مادر با تاکید بر آن



(۵) بهترین وضعیت قرارگیری سر در زمان تغذیه
کودک مبتلا به شکاف کام قبل از عمل جراحی
کدام است؟

نمره: ۱ از ۱

- ☐ خوابیده به پشت و سر افقی
- ☐ خوابیده به پهلو سر ۳۰ درجه بالاتر از بدن
- ☐ قرار گرفتن در دست مراقب و سر در وضعیت افقی
- ☒ قرار گذاشتن در دست مراقب و سر در وضعیت قائم 

(۶) در مراقبت از نوزاد بستری در بخش مهمترین
اقدام برای پیشگیری از عفونت چیست؟

نمره: ۱ از ۱

☒ شست و شوی دست ها 

- ☐ پوشیدن گان
- ☐ پوشیدن دستکش
- ☐ پوشیدن روکش کفش



۹) مشارکت والدین در مراقبت از نوزاد برای کدام هدف زیر صورت می گیرد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ کاهش استرس والدین

☐ پرورش حس مادری

☐ بهبود توانمندی مادر در مراقبت از نوزاد

☒ همه موارد



۱۰) کدامیک از نشانه های زیر بیانگر دهیدراته شدن نوزاد نیست؟

نمره: ۱ از ۱

☒ کاهش دفع مدفوع



☐ کاهش دفعات ادرار

☐ کاهش تورگور پوستی

☐ دپرسیون فونتانل ها

۳) کدام گزینه در خصوص درمان بیماری ون ویلبراند صحیح می باشد؟

نمره: ۱ از ۱

تزریق فاکتور IX ☐

داروی DDAVP ☐

Humate_P ☐

ب و ج ☒ 

۴) سندرم سندیفر همراه با کدام مورد دیده می شود؟

نمره: ۱ از ۱

تنگی هیپرتروفیک پیلور ☐

ریفلاکس معده به مری ☒ 

آترژی مری ☐

هیپوتیروئیدیسم مادرزادی ☐



۱۳) از محدود کننده های آرنج بعد از عمل شکاف لب
به چه منظوری استفاده می شود؟

نمره: ۱ از ۱

جلوگیری از سایش بخیه ها توسط نوزاد ☒



جلوگیری از بی قراری نوزاد ☐

تسکین درد نوزاد ☐

پیشگیری از قرار دادن انگشت نوزاد در دهان ☐

۱۴) کدامیک از ناهنجاری های زیر آسیب روانی
بیشتری به والدین وارد می کند؟

نمره: ۱ از ۱

شکاف لب ☐

شکاف کام ☐

ابهام جنسی ☒



اکستروفی مثانه

۱۷) کدامیک از اهداف درمانی ناهنجاری های ادراری تناسلی (هیپوسپادیا/اپی‌سپادیا/زیس) نیست؟

نمره: ۰ از ۱

☐ ایجاد مجرای طبیعی برای خروج ادرار

☐ بهبود وضعیت ظاهری دستگاه تناسلی

☒ افزودن توانایی ادرار کردن در وضعیت ایستاده



☐ حفظ باروری

۱۸) کدام یک از توجهات پرستاری در کودک مبتلا به ابهام جنسی، جزو حمایت ارتباطی/اطلاعاتی محسوب نمی‌شود؟

نمره: ۰ از ۱

☐ پذیرش احساسات والدین

☐ تاکید بر امکان تکامل به صورت یک جنس

☐ نشان دادن تصاویر قبل و بعد از ترمیم

☒ صداقت در گزارش عیب



۹) فوندوپلیکیشن نیسن، مداخله جراحی مخصوص کدام بیماری می باشد؟

نمره: ۱ از ۱

بتاتالاسمی ☐

Gastroesophageal Reflux Diseases ☒



آترزی مری ☐

Pyloric Hypertrophic stenosis ☐

۱۰) کدام تشخیص پرستاری در کودکان مبتلا به لوسمی معمول نمی باشد؟

نمره: ۱ از ۱

اختلال در تصویر ذهنی از جسم خویش در ارتباط با چاقی ☒



خطر عفونت در ارتباط با ضعف سیستم ایمنی ☐

تغذیه نامتعادل ناشی از دریافت کمتر از نیاز بدن در ارتباط با از دست دادن اشتها ☐

آسیب بافت مخاط پوششی دهان در ارتباط با داروهای شیمی درمانی ☐



(۷) برای پیشگیری از آسیب پوستی نوزاد کدام اقدام کمک کننده است؟

نمره: ۱ از ۱

☐ استفاده از قیچی برای باز کردن چسب ها

☒ استفاده از چسب های دئودرم



☐ استفاده از چسب کاغذی

☐ استفاده از لکوپلاست

(۸) تفسیر رفتارهای نوزاد برای والدین به چه منظوری انجام می گیرد؟

نمره: ۱ از ۱

☒ کاهش استرس والدین



☐ افزایش دانش والدین

☐ بهبود مراقبت از نوزاد

☐ کاهش بار کاری پرستاران

۳) مهم ترین اقدام در کودک ۹ ماهه ای که دچار آسپیراسیون تنفسی شده است چیست؟

نمره: ۰ از ۱

سروته کردن کودک و زدن به پشت او ☐

ضربه زدن به بین دو کتف و فشردن قفسه سینه ☒



اعمال فشار در زیر دیافراگم ☐

تلاش جهت خارج کردن جسم خارجی با انگشت ☐

۴) برای پیشگیری از استرس سرما در هنگام توزین نوزاد کدام اقدام زیر ضروری است؟

نمره: ۰ از ۱

پوشاندن نوزاد با پتو ☒



بالا بردن درجه حرارت اتاق ☐

قرار دادن نوزاد در روی ترازوی گرم ☐

استفاده از ترازوی دیجیتال 

(۱) کدام یک از اهداف ماساژ پشت یا کف پا در نوزادی که به علت هیپوکسی دچار بی قراری شده است، نیست؟

نمره: ۱ از ۱

☐ تحریک تنفسی نوزاد

☐ کمک به خروج ترشحات نوزاد

☐ بهبود وضع اکسیژناسیون

☒ کمک به کاهش بی قراری نوزاد 

(۲) مناسب ترین وضعیت برای خواب نوزاد چیست؟

نمره: ۱ از ۱

☐ خوابیده به شکم

☐ خوابیده به پشت

☐ خوابیدن به پهلو

☒ سرتخت بالاتر از ۳۰ درجه 

24. کدام مورد در خصوص نوزاد مبتلا به آترزی مری صحیح نمی باشد؟

☐ نوزاد آبریزش کف آلود از دهان دارد.

☐ اکثراً تعبیه NGT با مشکل مواجه می‌شود.

☒ خطر اختلال در دلبستگی والد-نوزاد و اختلال در سازگاری والدین جزو تشخیص های پرستاری است. ✓

☐ در صورت عدم وزن‌گیری پس از جراحی، تغذیه با NGT استفاده می‌شود.

صفحه : 24 از 36 / تعداد سوال این صفحه: 1

مرور پاسخ ها

➤ صفحه بعدی

حذف انتخاب برای برگشت به صفحه (3 از 8)

اتمام آزمون

31. آتل متحرک پاولیک هارنس در درمان کدام گزینه به کار می‌رورد؟

☐ نوزاد مبتلا به کلاب فوت

☐ نوزاد مبتلا به DDH

☒ کودک مبتلا به کلاب فوت

☐ کودک مبتلا به DDH

صفحه : 31 از 36 / تعداد سوال این صفحه: 1

مرور پاسخ‌ها

صفحه بعدی >

اتمام آزمون

انتخاب برای برگشت به صفحه (4 از 8)

18. کدام گزینه، در خصوص زمان مناسب آموزش بررسی درد به والدین کودک، صحیح می باشد؟

☐ زمان پذیرش کودک به بخش

☐ قبل از عمل

☐ بعد از جراحی الکتیو

☒ الف و ب

صفحه : 18 از 36 / تعداد سوال این صفحه: 1

مرور پاسخ ها

صفحه بعدی

اتمام آزمون

انتخاب برای برگشت به صفحه (1 از 8)

32. به عنوان یک پرستار در اورژانس با دیدن علایم فقدان سرفه، ریزش بزاق از دهان و بی قراری در یک کودک 3 ساله به یکی از سندرم های کroup شک می کنید. بر این اساس چه اقدامی را مورد توجه قرار می دهید؟

☒ انجام معاینه گلو با آبسلانگ

☐ کنترل درجه حرارت دهانی

☐ آماده بودن وسایل انتوباسیون

☐ نمونه برداری از ترشحات حلق

صفحه : 32 از 36 / تعداد سوال این صفحه: 1

مرور پاسخ ها

صفحه بعدی

اتمام آزمون

التخاب برای برگشت به صفحه (4 از 8)

36. در معاینه اولیه کودک 8 ساله، متوجه می شوید که قد و وزن کودک بسیار کمتر از مقادیر متناسب با سن اوست. با بررسی بیشتر متوجه بستری های مکرر به دلیل مشکلات تنفسی می شوید. همچنین کلابینگ انگشتان و علایم مربوط به تنگی نفس را هم در او می بینید. بر اساس بیماری زمینه ای کودک، مهمترین هدف در مراقبت از او چیست؟

اصلاح الکترولیت ها ☐

پاکسازی مؤثر راه های هوایی ☐

تأمین رشد و تکامل ☒

کنترل مشکلات گوارشی ☐

صفحه : 36 از 36 / تعداد سوال این صفحه: 1

مرور پاسخ ها

صفحه بعدی

اتمام ۱۴:۴۱

حذف انتخاب برای برگشت به صفحه (5 از 8)



سوال ۱ از ۱۰

کودک ۳ ساله ایر در بیمارستان بستری است. در بررسی های که انجام داده اید، کداسیک از یافته های زیر غیر طبیعی است؟

گزینه ها

☐ احتیال در الگوی خواب

☐ تهاجم کلامی به هنگام دیدن پرستاران

☒ بی اعتنایی به اطراف

☐ همه موارد

دریافت سوال

حذف سوال

سوال ۲ از ۱۰

احتمال دیس ریتمی در کداسیک از ناهنجاری های مادرزادی قلبی بالاست؟

گزینه ها

☐ Torsade of Point

☒ Atrial Septal Defect

☐ Transposition of the Great Arteries

☐ Coarctation Of the Aorta

دریافت سوال

حذف سوال

سوال ۳ از ۱۰

مهمترین مراقبت پرستاری در کودک مبتلابه Congenital clubfoot که تحت اعمال اصلاحی با آتل یا گچ قرار گرفته کدام مورد است؟

گزینه ها

☐ مراقبات بهداشت فردی کودک

☐ در نظر گرفتن بی قراری و گریه کودک

☐ حمایت روانی و عاطفی از والدین

☒ بررسی دقیق پوست و جریان خون نامیده

دریافت سوال

حذف سوال

سوال ۴ از ۱۰

در نوزاد تازه متولد شده پرستار با دیدن کدام یک از علائم زیر احتمال دیسپلازی مفصل ران را می دهد؟

گزینه ها

☐ عدم تقارن در چین های ناحیه باسن

☐ محدودیت در انداختن کامل

☐ کوتاه بودن یکی از ران ها در سطح زانوها

☒ همه موارد فوق

دریافت سوال

حذف سوال

سوال ۵ از ۱۰

متاستیز درمان در کودکان زیر شش ساله به DDH کدام گزینه است؟

گزینه ها

☐ گچ گیری به روش بانستی

☐ آتل دسین برتون

☐ گچ گیری آسپایک

☒ آتل متحرک باپولیک، هاراس

دریافت سوال

حذف سوال

سوال ۶ از ۱۰

کدامیک از ناهنجاری های حین تولد کلس با افزایش جریان خون ریوی همراه است؟

گزینه ها

☐ کوار کانسپشن آئورت

☒ نقص دیواره پس نفس

☐ نترتیوی هالت

☐ تنگ دریچه آئورت

بررسی سوال

حذف سوال

سوال ۷ از ۱۰

هدف اصلی درمان و مراقبت در آرتریت ایدئوپاتیک جوانان کدام است؟

گزینه ها

☐ از بین بردن فاکتورهای التهابی

☐ کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری

☐ ارتقای اعتماد به نفس بیمار

☒ حفظ دامنه حرکت و عملکرد مفصل

بررسی سوال

حذف سوال

سوال ۸ از ۱۰

مارش پمپاش شدن انگشتان (کلاپینگ) در کودکان مبتلا به ناهنجاری مادرزادی قلب چیست؟

گزینه ها

☐ پالس ساینوسی

☒ هیپوکسمی

☐ احساس خفگی در اندام ها

☐ همه موارد

بررسی سوال

حذف سوال

سوال ۹ از ۱۰

هدف از تجویز پروستاگلاندین E در کودکان مبتلا به ناهنجاری های سیانوتیک شدید چیست؟

گزینه ها

☐ به منظور بالا بردن فشار خون در اندام ها

☒ افزایش موقت احتلاط خون

☐ بسته شدن کانال شریانی

☐ افزایش گردش خون معر

بررسی سوال

حذف سوال

سوال ۱۰ از ۱۰

کودکی با علامت تب، التهاب ملتحمه، اریتم و زبان توت قرنگی در بخش بستری است. کدام گزینه از مهمترین نکات آموزشی به والدین کودک است؟

گزینه ها

☒ بررسی های دوره ای کتب

☐ تغذیه با مایعات صاف شده

☐ نحوه کنترل تب

☐ جلوگیری از آسیب های پوستی

سوال ۱ از ۲۰

سوال یک

گداختیگ از نورادان زیر چرو نورادان بر خطر محسوب نمي شود؟

الف- نورادان هاتران دانشي

ب- نورادان تارسي گلمر از ۲۵ هفته

ج- نورادان ماچون ۲۵۰۰ گرم

د- نورادان هاتران با قشدر جون دلا

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

سوال ۲ از ۲۰

سوال دو

در مراقبت از نوزاد بر خطر براي حفظ درجه حرارت نوزاد کدام مورد نواخته نمي شود؟

الف- هاتردوزنگ مداوم درجه حرارت بدن از طريق ريويت پوستي

ب- حفظ درجه حرارت محيط در بين ۲۵-۲۹

ج- استفاده از کلاه پارچه اي

د- کنترل سوزن قند ي

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

☐ گزینه ۳

☐ گزینه ۴

سوال ۳ از ۲۰

سوال سه

نوزاد بر خطر نوزادي است که:

الف- ضايعات دائمي مزمن و غير داخلة باشد.

ب- دچار ده مراقبت ویژه داخلة باشد.

ج- ضايعات مريده يه در آران بالابست

د- هفت نوزاد

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

سوال ۴ از ۲۰

سوال ۴

براي پيشگيري از عفونت در نوزادان کدام اقدام زير را انجام نمي دهند؟

الف- استفاده از وسایل يک بار مصرف براي نوزاد

ب- زخايت زکات اندويل در رويه ها

ج- حفاظت آزاد در محلي نوزادان

د- آويخته کردن نوزادان عفوني

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

سوال ۵ از ۲۰

سوال ۵

محتملترين و ساده ترين زخايت پيشگيري از عفونت بهداشتي در نوزادان چیست؟

الف- شستن دست

ب- استفاده از وسایل يک بار مصرف

ج- استفاده از آبي يويک

د- استفاده از وسایل شستني نوزاد

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

سوال ۶ از ۲۰

■ سوال ۶ از ۲۰

سوال هست

تعدادی دو تیرانداز بین ۲۹ و ۳۹ همه از چه طریقی است؟

الف: دهانی

ب: از طریق گلوله

ج: گلوله و دهانی

د: هر دو

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

■ سوال ۷ از ۲۰

سوال هست

برای مراقبت از پوست بزرگ کدام اقدام صحیح است؟

الف: استفاده از گرم ضد آفتاب

ب: استفاده از روغن

ج: استفاده از قیچی برای در کردن چربیها

د: خودداری از استفاده از لکوبانست

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

■ سوال ۸ از ۲۰

سوال هست

برای برقراری تعامل بین والدین و بزرگ کدام اقدام تاثیر بیشتری دارد.

الف: انجمن بزرگ توسط والدین

ب: مخالفت بزرگ

ج: در انجمن گرفتن بزرگ

د: مشارکت در مراقبت

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

■ سوال ۹ از ۲۰

سوال نه

علائم سینوسی ریتمی در نوزاد کدامیک از موارد زیر است؟

الف: تپ

ب: سینوسی نظمی

ج: شبه انحراف

د: ریتمی

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

■ سوال ۱۰ از ۲۰

سوال نه

کدامیک از موارد زیر جزو نشانه های قلبی سینوسی نیست؟

الف: آپنه

ب: کاهش سطح هوشیاری

ج: انحراف پتوری

د: کاهش تن عضلانی

☐ گزینه ۱ ☐ الف

❏ سوال ۱۱ از ۲۰

سوال بازده

تغییرات خارج معمری داخلی در سیزده چگونه است؟

الف- کاهش پروسس خارج معمری داخلی

ب- افزایش ضد خارج معمری داخلی

ج- کمر شدن خارج معمری داخلی

د- افزایش گشودگی های مفصل

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

❏ سوال ۱۲ از ۲۰

سوال بازده

کدامیک از ملل معینی مربوط به شکاف کمر و لب **نیست**؟

الف- مستقیم ها

ب- خمیده خمیده خمیده در خارج

ج- خمیده قوس نواری توسط خارج

د- خمیده خمیده

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

❏ سوال ۱۳ از ۲۰

سوال بازده

کدامیک از راهبردهای های رید در سوزوگرافی دوران بارداری قابل مشاهده است؟

الف- شکاف کمر

ب- شکاف لب و کام

ج- شکاف لب

د- هیپرکام

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

❏ سوال ۱۴ از ۲۰

سوال بازده

مشکلات تکلیف از مشکلات بعد از فصل کدام راهبردهای است؟

الف- شکاف کام

ب- شکاف لب

ج- شکاف لب و کام

د- هیپرکام

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

❏ سوال ۱۵ از ۲۰

سوال بازده

کدام اقدام زیر در کمک به دوزگاری والدین با راهبردهای نوزاد کمک کننده است؟

الف- توجه به نیاز عاطفی والدین

ب- قرار دادن نوزاد در آغوش والدین

ج- تسهیل والدین برای دیدن اختلالات

د- تأکید بر روی فستهای سالم بدن نوزاد

☐ گزینه ۱ ☐ گزینه ۲

سوال ۱۶ از ۲۰

سوال شماره

مکانی همجنس‌گرایان کدام گروه می‌باشد؟

الف- جوانان

ب- تمام جوانان زیر یک سال

ج- کودکان بالای یک سال

د- همه‌ی آن‌ها

☐ گزینه ۱

☒ گزینه ۲

سوال ۱۷ از ۲۰

سوال شماره

هر یک از این گروه‌ها کدام یک است؟

الف- تمام جوانان زیر یک سال

ب- تمام جوانان یک تا دو ساله به اینده

ج- تمام جوانان سه تا چهار ساله

د- تمام جوانان پنج تا شش ساله

☐ گزینه ۱

☒ گزینه ۲

سوال ۱۸ از ۲۰

سوال شماره

مکانی مورد بررسی در این مطالعه چیست؟

الف- در پسران

ب- اغلب با همجنس‌گرایان

ج- در تمام جوانان

د- در تمام جوانان

☐ گزینه ۱

☒ گزینه ۲

سوال ۱۹ از ۲۰

سوال شماره

مکانی مورد بررسی در این مطالعه چیست؟

الف- مردان جوان (young men)

ب- مردان جوان (young men)

ج- مردان جوان (young men)

د- مردان جوان (young men)

☐ گزینه ۱

☒ گزینه ۲

سوال ۲۰ از ۲۰

سوال شماره

مکانی مورد بررسی در این مطالعه چیست؟

الف- جوانان

ب- تمام جوانان

ج- تمام جوانان

د- تمام جوانان

☐ گزینه ۱

☒ گزینه ۲

۱۱. کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

- ☐ هموسیدرومیس: همان رسوب آهن در بافت ها و آسیب ستونی و فیبروز بافت می باشد.
- ☐ اسفراف چنده از علایم اصلی تنگی پیلور می باشد.
- ☐ نارسوب مهمترین عامل خطر لنئوپلازی است نکرورال می باشد.
- ☐ در نوارد مبتلا به امپالوسل عفونته عامل تهدید آمیز دانش قبل از جراحی محسوب می شود.

عنوان آزمون: پرستاری بیماریهای کودکان - نام درس: پرستاری بیماری های کودکان - زمان مانده: 00:05:45 - نام آزمون:

33 در مورد کودکی که تعداد ضربان قلب او 80 ضربه در دقیقه بوده و دچار آهسته است، چه اقدامی مناسب خواهد بود؟

☒ شروع تنفس و آمیاز به مدت 2 دقیقه

☐ تنفس با فشار مثبت به اعداد 20 تنفس در دقیقه

☐ آمیاز قلبی با سرعت 100 ضربه در دقیقه

☐ چک وضعیت تنفس و قلب به مدت 10 ثانیه

00:15:04 زمان مانده: پرستاری بیماری های کودکان * نام درس: پرستاری بیماری های کودکان * عنوان آزمون:

25 کودک 7 ساله ای با حمله آسم در بخش اورژانس بیمارستان کودکان است. کدام گزینه در انجام مراقبت از این کودک صحیح است.

☒ تعبیه خط وریدی بعد از شروع اکسیژن درمانی انجام می شود

☐ آموزش نحوه استفاده از اسپری ها در این زمان مناسب است.

☐ کاهش اضطراب کودک در این مرحله در اولویت نمی باشد.

☐ همه موارد فوق صحیح است.

صفحه 1 از 1 تعداد سوال این صفحه: 1

تیمار و مراقبت از کودکان

نام آزمون: پرستاری بیماریهای کودکان - نام درس: پرستاری بیماریهای کودکان - زمان مانده: 00:19:16 - نام آزمون: نام آزمون

در مراقبت از کودک مبتلا به گاوازاکی که تحت درمان دارویی طولانی می باشد کدام مورد را بسیار ضروری می دانید؟

☐ استفاده از لوسون های معده

☐ تریق به موقع و آهسته ها

☐ انجام حرکات ROM

☐ کاهش پروتئینهای نهان

ساخته: ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ - تعداد سوال این صفحه: ۱ - پاسخ صحیح: ۱ - پاسخ نادرست: ۰

30. تنگی درجه بولمونر با کدام مکانیسم می تواند باعث ایجاد نارسایی قلبی در کودکان گردد؟

☐ تپش های بالای بارده قلبی

☐ ازدیاد بار فشار

☒ کاهش قابلیت انقباضی

☐ ازدیاد بار حجم

34 کدام گزینه از اندیکاسیون های بستری کودکان مبتلا به پنومونی نمی باشد؟

☐ وجود لقاح های فلن

☐ کودکان کوچکتر از یک ماه

☐ دیسترس تنفسی متوسط تا شدید

☐ تب دار بودن کودک

نام

00:23:24

زمان ماندن

نام درس

بررسی سبزی های کودکان

سوال آزمون

بررسی معاینات کودکان

شروع ناگهانی میانه و یا تشدید آن و تنگی نفس در کدامیک از تقابص قلبی بدو تولد محتمل تر می باشد؟

COA

PDA

TGE

ASD

صفحه 1 از 10

از 10 سوال این آزمون

پاسخ صحیح

پاسخ نادرست

2 در کودک مبتلا به تشنج اولین اولویت شما در مراقبت از کودک چیست؟

☒ دادن اکسیژن به کودک حین تشنج

☐ بستن اندامهای کودک به تخت

☐ بالا بردن میله های کنار تخت کودک

☐ مانیتورینگ مداوم کودک

22 کدام مورد در خصوص روش‌های تشخیص ریفلاکس معده به مری در نوزادان به کار می‌رود؟

- ☐ تشخیص PH مری به مدت ۲ ساعت
- ☐ بررسی خصوصیات استفراغ و خون معده در مدفوع
- ☐ تستی گرافی هستهای
- ☒ ب و ج

28. شروع ناگهانی سیانوز و یا تشدید آن و تنگی نفس در کدامیک از نقایط قلبی بدو تولد محتمل تر می باشد؟

COA ☐

PDA ☐

TOF ☐

ASD ☐

≡ سوال ۴ از ۲۰

سوال ۴

برای پیشگیری از عفونت در نوزادان کدام اقدام زیر را انجام **نمی** دهید؟

الف- استفاده از وسایل یک بار مصرف برای نوزاد

ب- رعایت نکات استریل در رویه ها

ج- ملاقات آزاد در بخش نوزادان

د- ایزوله کردن نوزادان عفونی

گزینه ج

گزینه ۱:



4. اولین علامت فلج مغزی در کودکان چیست؟

☐ عدم توانایی برای راه رفتن

☐ ثبوت رفلکس های شیرخوارگی

☐ عدم توانایی برای تکلم

☐ عدم شناخت والدین

(۱) مطلوب ترین ابزار سنجش درد در بخشهای جراحی کودکان، از نظر والدین با فرهنگهای مختلف کدام است؟

نمره: ۰ از ۱

☐ اوچر

☐ ونگ بکر

☐ آنالوگ دیداری

☒ همه به یکسان



(۲) کدام مورد در مدیریت درد کودکان کاملاً صحیح می باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ از خود کودک برای اندازه گیری درد در کودکان بستری استفاده نکنیم.

☐ نوزادان نیز درد را حس میکنند، ولی استفاده از مواد مخدر برای تسکین درد آنها استفاده نمیشود.

☒ درد بعنوان پنجمین علامت حیاتی و جزو استانداردهای مراقبتی از سال ۲۰۰۱ به بعد می باشد.



☐ از بین روشهای تسکین درد، روشهای فارماکولوژیک موثرند و همیشه بایستی استفاده شوند.



14. کدام مورد در خصوص روش‌های
تشخیص ریفلاکس معده به مری در نوزادان به
کار می‌رود؟

☐ سنجش PH مری به مدت ۲ ساعت

☐ بررسی خصوصیات استفراغ و خون مخفی در مدفوع

☐ سینتی گرافی هسته‌ای

☐ ب و ج

22. کدام گزینه در خصوص استاندارد عملکرد مدیریت درد کودکان کاملاً صحیح نمی باشد؟

☐ آموزش و صلاحیت بررسی و اداره درد کودک ، در هر کارمند تازه وارد و قبلاً شاغل بایستی ارزیابی شود.

☐ درد به طور مرتب، با یک ابزار مناسب بررسی و دوباره بررسی می شود.

☒ وقتی رویکرد بررسی و اداره درد کفایت می کند که اعضای تیم مراقبت با یکدیگر مشارکت نمایند.

☐ سیاست ها و خط مشی ها جهت یکپارچگی و کیفیت ارزیابی درد تهیه می شوند.

۱۷) کدام گزینه در مورد تغذیه کودک ۵ ماهه مبتلا به اسهال و دهیدراتاسیون خفیف درست است؟

نمره: ۱ از ۱


- ☐ تغذیه با فرمولا بر شیر مادر ترجیح داده می شود.
- ☐ به منظور جایگزینی مایعات فقط از ORS استفاده شود.
- ☒ ORS و نیز شیر مادر به کودک داده شود. ✓
- ☐ همراه با شیر مادر از رژیم برت و مایعات صاف شده استفاده شود.

۱۸) کدام مورد برای افزایش جذب آهن در کودک مبتلا به بیماری آنمی فقر آهن صحیح نیست؟

نمره: ۰ از ۱

- ☒ خوردن فروس سولفات همراه با شربت شیر منیزی ✗
- ☐ خوردن اسفناج زیاد بعلت جذب بالای آهن آن
- ☐ تجویز آهن بین غذاها و مصرف گوشت ماکیان
- ☐ موارد الف و ب

۱۹) کودک ۷ ماهه ای که تشخیص انواژیناسیون داده شده روی اظهار می کند که کودکش گریه می کند کدام گزینه  گریه کودک را توصیف می کند؟



نام درس: پرستاری بیماری های کودکان 2

زمان مانده: 00:43:10

نام آزمون دهنده: زینب السادات حجاری

کدام مورد در خصوص آزمایش غربالگری هیپوتیروئیدسم مادرزادی نوزادان و محل لانست زدن پاشنه جهت تهیه خون مربوطه صحیح نیست؟

(محل لانست زدن، قسمت مرکزی پاشنه یا است.

(اندازه گیری TSH و T4 برای تشخیص بیماری لازم است.

(زمان آزمایش غربالگری هیپوتیروئیدسم مادرزادی روز ۲ تا ۵ تولد می باشد.

(درمان بیماری با داروی سیتروئید و گاهی ویتامین د است.

صفحه بعدی

مراجعه ها

صفحه: 11 از 24 تعداد سوال این صفحه: 1

انتخاب برای برگشت به صفحه 8 از 8

≡ سوال ۱۸ از ۲۰

سوال هیجده

کدام مورد درباره اکستروفی مثانه صحیح **نیست**؟

الف- در پسرها شایعتر است

ب- اغلب با هیپوسپادیازیس همراه است

ج- waddling gait از نشانه های این بیماری است

د- ساییدگی پوست اطراف مثانه شایع است

گزینه ۱: ☒ ☐ گزینه ب

15. کدام مورد در خصوص آماده کردن کودکان برای پروسیجرها بر اساس شخصیات تکاملی آن صحیح نمی باشد؟



کودک خردسال را در مراقبت مستقیم سهیم نمائید (مثل داری وسایل یا برداشتن پانسمان).

☐ اجازه دهید کودک شیرخوار با وسایل مینیاتوری یا واقعی مراقبت بازی کند.

☐ والدین را در مسیر دید شیرخوار نگه دارید.



سوال ۵

مهمترین و ساده ترین روش پیشگیری از عفونت بیمارستانی در نوزادان چیست؟

الف- شستن دست

ب- استفاده از وسایل یک بار مصرف

ج- استفاده از آنتی بیوتیک

د- استفاده از وسایل مختص نوزاد

گزینه الف

گزینه ۱: ☒

۵) توصیه تغذیه ای به خانواده کودک ۱۸ ماهه مبتلا به فنیل کتونوریا (PKU)، شامل مصرف در حد تمایل موارد زیر است بجزء؟

نمره: ۱ از ۱

☐ شیر مادر

☐ آب پرتقال و آب هویج

☐ کتلت گوشت

☒ الف و ج 

۶) نوزاد ۲۰ روزه مبتلا به هیپوتیروئیدیسم مادرزادی تشخیص داده شده است و داروی لو تیروکسین تجویز شد. کدام مورد صحیح نمی باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☒ آسیب به مغز وارد شده است. 

☐ داروی لو تیروکسین تا ۱۸ سالگی مصرف می کند.

☐ مقادیر خونی TSH و T₄ و T₃ بصورت دوره ای آزمایش می شود.

☐ تغییرات وزن و تعداد ضربانات قلب بایستی کنترل شوند. 

9. با کدامیک از ابزار احیاء زیر می توان برای نوزاد بدحال PEEP ایجاد کرد؟

☐ دستگاه تی پیس

☐ بگ وابسته به جریان

☐ بگ خود متسع شونده

☐ الف و ب

۳) به منظور پیشگیری از کدام عارضه مهم، باید فنیل کتونوری در نوزادی تشخیص داده شود؟

نمره: ۱ از ۱

☐ آتروفی شدید ویلوزیته ها

☐ تاخیر در رشد جسمی

☐ اسهال شدید

☒ عقب ماندگی ذهنی 

۴) چه میزان مایع، برای تنقیه و تمیز کردن روده کودکان ۲ تا ۴ سال صحیح می باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☒ cc ۲۵۰ 

☐ cc ۱۲۰

☐ cc ۱۸۰

☐ cc ۲۰۰

۵) توصیه تغذیه ای به خانواده کودک ۱۸ ماهه مبتلا به فنیل کتونوریا (PKU)، شامل مصرف در حد تمایل موارد زیر است



نمره: ۱ از ۱

2 برای جلوگیری از نشت مایع مغزی نخاعی
پاره شدن کیسه در نوزاد مبتلا به
سنگومیلوسل کدام اقدام موثر است؟ است؟

☐ قرار دادن نوزاد در وضعیت خوابیده به پشت با الیوشن سر

☐ قرار دادن داخل انکوباتور و پوشاندن ناحیه با گاز استریل خشک

☐ خواباندن نوزاد در آغوش مادر و کنترل مکرر ناحیه از نظر نشتی

☐ پانسمان مرطوب با سرم فیزیولوژی و تعویض هر 2-4 ساعت

≡ سوال ۱۷ از ۲۰

سوال هفده

تعریف دقیق کریپتورکیدیسم چیست؟

الف- عدم نزول یک بیضه

ب- عدم نزول یک یا دو بیضه به کیسه اسکروتوم

ج- وجود بیضه ها در داخل شکم

د- پس رفتگی بیضه ها به داخل شکم در مجرای پروسوس

گزینه ۱: ☒ گزینه ب

≡ سوال ۱۰ از ۲۰

سوال ده

کدامیک از موارد زیر جزو نشانه های عصبی سپسیس نیست؟

الف- آپنه

ب- کاهش سطح هوشیاری

ج- تحریک پذیری

د- کاهش تن عضلانی

گزینه ۱: ☒ الف

≡ سوال ۸ از ۲۰

سوال هشت

برای برقراری تعامل بین والدین و نوزاد کدام اقدام تاثیر بیشتری دارد

الف- لمس نوزاد توسط والدین

ب- ملاقات نوزاد

ج- در آغوش گرفتن نوزاد

د- مشارکت در مراقبت

گزینه د

گزینه ا:



۱۹) کودک ۷ ماهه ای که تشخیص انواژیناسیون داده شده
مادر وی اظهار می کند که کودکش گریه می کند کدام گزینه
گریه کودک را توصیف می کند؟

نمره: ۱ از ۱

☒ متناوب همراه با جمع کردن پاها روی شکم 

☐ مداوم همراه با بازکردن پاها روی زمین

☐ تیز و متناوب و در موقع شیرخوردن

☐ مداوم هنگام قرارگرفتن درپوزیشن رو به شکم

۲۰) رژیم غذایی کودک مبتلا به مگاکولون مادرزادی کدام
است؟

نمره: ۰ از ۱

☒ پرکالری و دارای فیبر زیاد 

☐ دارای باقیمانده کم

☐ حاوی ویتامین و فیبر زیاد

☐ پرپروتئین و پرچربی



≡ سوال ۱۹ از ۲۰

سوال نوزده

شایعترین نوع ابهام جنسی کدام است؟

الف- مردانه شدن جنس مونث (masculinized female)

ب- مردانه شدن ناکامل جنس مذکر (masculinized male)

ج- وجود هر دو اندام جنسی زنانه و مردانه

د- دیس ژنزی مختلط گونادی (Gonadal digenesis)

گزینه ۱: ☒ گزینه الف

36. در مراقبت از کودک مبتلا به کاوازاکی که تحت درمان دارویی طولانی می باشد کدام مورد بسیار ضروری می دانید؟

☐ استفاده از لوسیون های معطر

☐ تزریق به موقع واکسن ها

☐ انجام حرکات ROM

☐ کاهش پروسیجرهای تهاجمی

≡ سوال ۱ از ۲۰

سوال یک:

کدامیک از نوزادان زیر جزو نوزادان پر خطر محسوب **نمی** شوند.

الف- نوزادان مادران دیابتی

ب- نوزادان نارس کمتر از ۳۵ هفته

ج- نوزادان با وزن ۲۵۰۰ گرم

د- نوزادان مادران با فشار خون بالا

گزینه ۱: ☒ شماره ۳

≡ سوال ۲۰ از ۲۰

سوال بیست

کدام یافته به نفع ابهام جنسی نیست؟

الف- پنیس کوچک

ب- نزول بیضه ها

ج- اسکروتوم کوچک

د- سوراخ ادراری نابجا

گزینه ۱: ☒ گزینه ب

عنوان آزمون:	پرستاری بیمارهای کودکان	نام درس:	پرستاری بیماری های کودکان	⌚ زمان مانده:	00:41:38	🔊	نام آزمون:
--------------	-------------------------	----------	---------------------------	---------------	----------	---	------------

30. تهویه با استفاده از ماسک و کیسه در کدامیک از بیماری های زیر توصیه نمی شود؟

- ☐ نارسایی قلبی
- ☐ فنق دیافراگماتیک
- ☐ پنومونی اتمیک
- ☐ فیبروز کیستیک

نام درس:	پرستاری بیماری‌های کودکان *	⌚ زمان مانده:	00:21:34
----------	-----------------------------	---------------	----------

❏ کدام مورد در خصوص آماده کردن کودکان برای پروسیجرها بر اساس مشخصات تکاملی آن صحیح نمی باشد؟

☐ کودک مرخصی را در مراقبت مستقیم سپرد (مثل نگه داری وسایل یا برداشتن پانسمان).

☐ آماده دهید کودک شیرخوار با وسایل میندانوری یا واقعی مراقبت باری کند.

☒ والدین را در مسیر دید شیرخوار نگه دارید.

☐ اجازه دهید با نوجوان دیگری که پروسیجر بیوشی استخوان را تجربه کرده‌اند صحبت کند.

عنوان آزمون:	پرستاري بيماريهاي کودکان -	نام درس:	پرستاري بيماريهاي کودکان -	زمان مانده:	01:11:16	نام آزمون:
--------------	----------------------------	----------	----------------------------	-------------	----------	------------

1. کدام اقدام پرستاری زیر برای پیشگیری از عفونت در کودک مبتلا به سندرم نفروتیک در مرحله حاد بیماری حیاتی است؟

☐ کنترل مرتب فشار خون

☐ ایزوله معکوس

☐ تشویق کودک به استراحت مطلق

☐ محدود کردن مصرف آب و نمک

≡ سوال ۹ از ۲۰

سوال نه

علامت سپسیس زودرس در نوزاد کدامیک از موارد زیر است؟

الف- تب

ب- دیسترس تنفسی

ج- شیر نخوردن

د- زردی

گزینه ب

گزینه ۱: ☒

۷) کدام گزینه صحیح می باشد؟

نمره: ۰ از ۱

☐ تشخیص قطعی لوسمی لنفوسیتیک حاد با شمارش لنفوبلاست کمتر از ۲۵ درصد در مغز استخوان میباشد.

☒ علت استفاده از داروی دسفرال در بیماران بتاتالاسمی ماژور جلوگیری از دفع بیش از حد آهن است. 

☐ نوزاد فول ترم در سه ماهگی بدون دریافت مکمل آهن دچار کمبود فقر آهن خواهد شد.

☐ در درمان بیماری ون ویلبراند از داروی وازوپرسین / DDVP نیز استفاده می شود.

۸) کدام مورد در مراقبت از بیماران لوسمی لنفوسیتیک حاد تحت درمان با شیمی درمانی اقدام مناسبی نمی باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ بلند کردن ۳۰ درجه ای قسمت سر تخت بیمار در حین شیمی درمانی برای کاهش تهوع و استفراغ

☐ هیدراته نگه داشتن بیمار جهت دفع اسید اوریک اضافی ناشی از شکسته شدن سلولهای سرطانی

☒ آب پرتقال تا زمان تسکین و درمان موکوزیت 

☐ پیشنهاد استفاده از کلاه گیس در صورت ترجیح بیمار



○ استفاده از لوسيون های معطر

○ تزریق به موقع واکسن ها

○ انجرام حرکات ROM

○ کاهش پروتئین‌های التهابی

۱۱) در کودکان جهت تنقیه از چه نوع مایعی استفاده می گردد؟

نمره: ۱ از ۱

هیپرتونیک ☐

هیپوتونیک ☐

ایزوتونیک ☒ ✓

آب ساده ☐

۱۲) PKU به کدام مورد اطلاق می شود؟

۱- نبود آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز و تجمع فنیل آلانین در خون

۲- نبود آنزیم گالاکتوز فسفات اوریدیل ترانسفراز و تجمع گالاکتوز در خون

۳- بیماری متابولیک ارثی است

۴- بیماری سیستم عصبی مرکزی و ارثی است.

نمره: ۱ از ۱

۱و۴ ☐

۲و۴ ☐

۱و۳ ☒ ✓

۲و۳ ☐



۹) کدام گزینه در خصوص انتروکولیت نکروزان صحیح می باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☒ در نوزادان نارس بیشتر است. ✓

☐ بیماری نکروز معده است.

☐ در شیر خشک خواران کمتر است.

☐ ارتباط آن با سپسیس غیر محتمل است.

۱۰) کدام مورد، شایعترین علت استفاده از استوما در کودکان نمی باشد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ بیماری هیرشپرونگ

☐ آنوس بسته

☐ بیماری التهابی روده

☒ بیماری ویلمز ✓

۱۱) در کودکان جهت تنقیه از چه نوع مایعی استفاده می گردد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ هیپرتونیک



≡ سوال ۱۶ از ۲۰

سوال شانزده

مانور هیملیخ مناسب کدام گروه سنی است؟

الف- نوزادان

ب- شیر خواران زیر یک سال

ج- کودکان بالای یک سال

د- محدودیت سنی ندارد

گزینه ۱: ☒ گزینه ج

28. کودک 7 ساله ای با حمله آسم در بخش
ورژانس بیمارستان کودکان است. کدام گزینه در
نجام مراقبت از این کودک صحیح است؟

- ☐ تعبیه خط وریدی بعد از شروع اکسیژن درمانی انجام می شود.
- ☐ آموزش نحوه استفاده از اسپری ها در این زمان مناسب است.
- ☐ کاهش اضطراب کودک در این مرحله در اولویت نمی باشد.
- ☐ همه موارد فوق صحیح است.

عنوان آزمون:	پرستاری بیمارهای کودکان	نام درس:	پرستاری بیماری های کودکان 2	⌚ زمان مانده:	01:00:15	🔍
--------------	-------------------------	----------	-----------------------------	---------------	----------	---

17. کدام گزینه در خصوص استاندارد عملکرد در مدیریت درد کودکان کاملاً صحیح نمی باشد؟

- ☐ آموزش و صلاحیت بررسی و اداره درد کودک ، در هر کارمند تازه وارد و قبلاً شاغل بایستی ارزیابی شود.
- ☐ درد به طور مرتبه، با یک ابزار مناسب بررسی و دوباره بررسی می شود.
- ☐ وقتی رویکرد بررسی و اداره درد کفایت می کند که اعضای تیم مراقبت با یکدیگر مشارکت نمایند.
- ☐ سیاست ها و خط مشی ها جهت یکپارچگی و کیفیت ارزیابی درد تهیه می شوند.

28. تهویه با استفاده از ماسک و کیسه در کدامیک از بیماری های زیر توصیه نمی شود؟

☐ نارسایی قلبی

☐ فتق دیافراگماتیک

☐ پنومونی آتیبیک

☐ فیبروز کیستیک

سوال یازده

تغییرات مایع مغزی نخاعی در مننژیت چگونه است؟

الف- کاهش پروتئین مایع مغزی نخاعی

ب- افزایش قند مایع مغزی نخاعی

ج- کدر شدن مایع مغزی نخاعی

د- افزایش گلبول های سفید

گزینه ج

گزینه ۱: 

1. در کودک مبتلا به تشنج اولین اولویت شما در مراقبت از کودک چیست؟

☐ دادن اکسیژن به کودک حین تشنج

☐ بستن اندامها، کودک به تخت

☒ بالابردن میله های کنار تخت کودک

☐ مانیتورینگ مداوم نود



≡ سوال ۶ از ۲۰

سوال شش

تغذیه در نوزادان بین ۲۸ تا ۳۴ هفته از چه طریقی است؟

الف- دهانی

ب- از طریق گاوژ

ج- گاوژ و دهانی

د- وریدی

گزینه ۱: ☒

گزینه ب

35. تنگی دریچه پولمونر با کدام مکانیسم می تواند باعث ایجاد نارسایی قلبی در کودکان گردد؟

☐ نیازهای بالای بازده قلبی

☐ ازدیاد بار فشار

☐ کاهش قابلیت انقباضی

☐ ازدیاد بار حجم

≡ سوال ۱۵ از ۲۰

سوال پانزده

کدام اقدام زیر در کمک به سازگاری والدین با ناهنجاری نوزاد کمک کننده است؟

الف- توجه به نیاز عاطفی والدین

ب- قرار دادن نوزاد در آغوش والدین

ج- تشویق والدین برای بیان احساسات

د- تاکید بر روی قسمتهای سالم بدن نوزاد

✓ گزینه ۱:

گزینه د

🔍 ☆ ⌂ ⋮

عنوان آزمون: پرستاری بیماریهای کودکان ▾ نام درس: پرستاری بیماریهای کودکان ▾ زمان مانده: 00:55:01 🕒 نام آزمون دهنده

10. نوزاد نارس 30 هفته با دیسترس تنفسی در بخش نوزادان بستری است، کدام روش تغذیه ای زیر را برای این نوزاد بکار می برید؟

☐ گاواز از طریق فیدینگ تیوب دهانی

☒ TPN

☐ تغذیه دهانی با شیر مادر

☐ تغذیه وریدی با سرم حاوی اسید آمینه + گاواز نوزاد از طریق نازال فیدینگ

پایه

سوال دو

در مراقبت از نوزاد پرخطر برای حفظ درجه حرارت نوزاد کدام مورد توصیه نمی شود؟

الف- مانیتورینگ مداوم درجه حرارت بدن از طریق پروب پوستی

ب- حفظ درجه حرارت محیط در بین ۲۴-۲۵

ج- استفاده از کلاه پارچه ای

د- کنترل سرم قندی

☒ گزینه ۱: گزینه ب

☐ گزینه ۲:

☐ گزینه ۳:

۱۵) کدام یک از گزینه های زیر احتمال آنوس ایمپرفوره را مطرح می کند؟

نمره: ۱ از ۱

☐ عدم دفع مکنونیوم تا ۲۴ ساعت

☐ نفخ شکم

☐ وجود مکنونیوم در ادرار

☒ همه موارد ✓

۱۶) نوزادی با سابقه پلی هیدرو آمنیوس به دنیا آمده است بلافاصله پس از تولد مقدار زیادی بزاق کف آلود در دهانش مشاهده می شود. محتملاً او به کدام یک از مشکلات زیر مبتلاست؟

نمره: ۱ از ۱

☐ شکاف کام

☒ آترزی مری ✓

☐ تنگی پیلور

☐ آمفالوسل

۱۷) کدام گزینه در مورد تغذیه کودک ۵ ماهه مبتلا به اسهال و دهیدراتاسیون خفیف درست است؟

18. کدام گزینه در خصوص استاندارد عملکرد در مدیریت درد کودکان کاملاً صحیح نمی باشد؟

آموزش و صلاحیت بررسی و اداره درد کودک ، در هر کارمند تازه وارد و قبلاً شاغل بایستی ارزیابی شود.

درد به طور مرتب، با یک ابزار مناسب بررسی و دوباره بررسی می شود.

وقتی رویکرد بررسی و اداره درد کفایت می کند که اعضای تیم مراقبت با یکدیگر مشارکت نمایند.

26. کدام گزینه از اندیکاسیون های بستری کودکان مبتلا به پنومونی نمی باشد؟

☐ وجود نقایص قلبی

☐ کودکان کوچکتر از یک ماه

☐ دیسترس تنفسی متوسط تا شدید

☒ تب دار بودن کودک

≡ سوال ۱۳ از ۲۰

سوال سیزده

کدامیک از ناهنجاری های زید در سونوگرافی دوران بارداری قابل مشاهده است؟

الف- شکاف کام

ب- شکاف لب و کام

ج- شکاف لب

د- هیچکدام

گزینه ج

گزینه ۱:



≡ سوال ۱۲ از ۲۰

سوال دوازده

کدامیک از علل محیطی مربوط به شکاف کام و لب **نیست**؟

الف- سندرم ها

ب- کمبود اسید فولیک در مادر

ج- مصرف فنی توئین توسط مادر

د- اشعه درمانی

گزینه ۱: ☒ گزینه الف

≡ سوال ۷ از ۲۰

سوال هفت

برای مراقبت از پوست نوزاد کدام اقدام ممنوع است؟

الف- استفاده از کرم ضد آفتاب

ب- استفاده از روی

ج- استفاده از قیچی برای باز کردن چسبها

د- خودداری از استفاده از لکوپلاست

گزینه ۱: ☒

گزینه ج

15. کدام مورد در خصوص آماده کردن کودکان برای پروسیجرها بر اساس مشخصات تکاملی آن صحیح نمی باشد؟

☐ کودک خردسال را در مراقبت مستقیم سهیم نمائید (مثل نگه داری وسایل یا برداشتن پانسمان).

☐ اجازه دهید کودک شیرخوار با وسایل مینیاتوری یا واقعی مراقبت بازی کند.

☐ والدین را در مسیر دید شیرخوار نگه دارید.

مرور پاسخ ها

➤ صفحه بعدی

صفحه : 15 از 36 / تعداد سوال این صفحه: 1

انتخاب برای برگشت به صفحه (1 از 8)

اتمام آزمون

سوال پانزده

کدام اقدام زیر در کمک به سازگاری والدین با ناهنجاری نوزاد کمک کننده است؟

الف- توجه به نیاز عاطفی والدین

ب- قرار دادن نوزاد در آغوش والدین

ج- تشویق والدین برای بیان احساسات

د- تاکید بر روی قسمتهای سالم بدن نوزاد

☒ گزینه ۱:

≡ سوال ۳ از ۲۰

سوال سه

نوزاد پرخطر نوزادی است که:

الف- شانس بالای مرگ و میر داشته باشد.

ب- نیاز به مراقبت ویژه داشته باشد

ج- شانس مربیدیت در آنان بالاست

د- همه موارد

گزینه د

گزینه ۱: 

۱۳) کودک مبتلا به بتاتالاسمی، عمل اسپلنکتومی شده است پرستار در طی آموزش ترخیص به والدین، توجه بیشتر به کدامیک از موارد زیر را آموزش می دهد؟

نمره: ۱ از ۱

☐ میزان قند خون

☐ کم خونی

☒ عفونت



☐ خونریزی

۱۴) در مراقبت پس از ترمیم شکاف لب، کاربرد کدام مورد نادرست است؟

نمره: ۰ از ۱

☐ prone position

☐ pain management

☐ restraint Elbow

☒ logan bow



≡ سوال ۱۴ از ۲۰

سوال چهارده

اشکالات تکلمی از مشکلات بعد از عمل کدام ناهنجاری است؟

الف- شکاف کام

ب- شکاف لب

ج- شکاف لب و کام

د- هیچکدام

گزینه ۱: ☒ گزینه الف

33

زمان مانده:

پرستاری بیماری های کودکان *

نام درس:

پرستاری بیماری های کودکان

عنوان آزمون:

در کودکان مبتلا به آسم هدف از درمان دارویی کدام یک از گزینه های زیر است؟

☐ انقباض لایژه ها و کاستن ترشحات

☒ کاستن التهاب و دفع ترشحات

☐ تسکین سرفه و کاهش تب

☐ انقباض راه هوایی و پیشگیری از عفونت



صفحه : 1 از 2

مرور پاسخ ها

به صفحه بعدی

...

☆

Search

🏠

📅

🔍

☰

عنوان آزمون: پرستاری بیماریهای کودکان - نام درس: پرستاری بیماری های کودکان - زمان مانده: 00:38:33 زمان صفحه: 1

در شیرخوارانی که مبتلا به عیوب قلبی منجر به سیانوز و هیپوکسمی هستند، کدام تهدید احتمالی زیر برای کودک خطرناک تر است؟

☐ کلاپس

☐ پلی سیمی

☐ وزن گیری نامناسب

☒ تاکی پنه

00:37:40

زمان مانده:

پرستاری بیماری های کودکان -

نام درس:

پرستاری بیماریهای کودکان

عنوان آزمون:

در اختلال DDH برای تشخیص نیمه در رفتگی یا گرایش به در رفتگی کدام ارزیابی تشخیصی مناسب است؟

☐ تست آلیس گالزی

☐ تست ابداکسیون

☐ تست ترندلنبرگ

☒ تست بارلو و ارتولانی

در مورد کودکی که تعداد ضربان قلب او 82 ضربه در دقیقه بوده و دچار آبنه است. چه اقدامی مناسب خواهد بود؟

- ☒ شروع تنفس و ماساژ به مدت 2 دقیقه
- ☐ تنفس با فشار مثبت به تعداد 20 تنفس در دقیقه
- ☐ ماساژ قلبی با سرعت 100 ضربه در دقیقه
- ☐ چک وضعیت تنفسی و قلبی به مدت 10 ثانیه

10. بهترین بخور در سندرم کroup کدام است؟

☐ گرم و خشک

☒ سرد و مرطوب

☐ گرم و مرطوب

☐ سرد و خشک

16 کدامیک از علائم زیر نشان دهنده افزایش فشار مغزی در یک کودک 6 ماهه مبتلا به هیدروسفالی است؟

☒ گریه تیز و بلند

☐ تاکیکاردی

☐ هیپوتانسیون

☐ هیپر رفلکسی

15 کدام عبارت در مورد عفونت ادراری نوزادان صحیح نیست؟

- ☐ علت اصلی عفونت در نوزادان دختر کوتاه بودن طول مجرای ادرار است.
- ☐ مهمترین عامل ایجاد کننده عفونت، استاز ادراری است.
- ☒ علایم در کودکان زیر دو سال اختصاصی است.
- ☐ در کودکان بالای دوسال، شب ادراری یا بی اختیاری ادرار در روز، از نشانه های کلاسیک عفونت است.

17 چرا تولد یک نوزاد با ابهام جنسی (Ambiguous genitalia) یک تراژدی اجتماعی است؟

☐ چون والدین دوست دارند جنسیت کودک خود را بدانند.

☒ چون فرایند تعیین جنسیت طولانی و پیچیده است.

☐ چون امکان تبدیل به یک جنس گاهی اوقات محال است.

☐ چون والدین از تولد این نوزاد احساس شرم و گناه می کنند.

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

انتخاب برای برگشت به صفحه 4 از 4

صفحه : 17 از 20

مرور پاسخ ها

صفحه بعدی >

11:10 AM
5/2/2021

30 با مشاهده کدامیک از رفتارهای زیر، به اختلال شناختی در کودک شک می کنید؟

☐ پاسخ بیش از اندازه به صدا یا حرکت

☐ آسیب‌رسانیون حین تغذیه

☒ تعاس چشمی ضعیف در حین تغذیه

☐ گریه بیش از حد

27 مادر نوزاد مبتلا به اکستروفی مثانه از تعویض پوشک نوزاد ابراز عجز و ناتوانی کرده و از شما درخواست کمک می کند، چه پاسخی به مادر می دهید؟

☐ به او می گوئید شما باید مشکل نوزادت را بپذیرید و خودت را با شرایط جدید وفق دهید.

☒ در حین تعویض پوشک از مادر می خواهید در کنار شما بایستد و شیوه تعویض پوشک را یاد بگیرد.

☐ مادر را مجبور می کنید تا تعویض پوشک را خودش انجام دهد تا اعتماد به نفسش زیاد شود.

☐ این واکنش مادر را طبیعی تلقی کرده و خودتان پوشک نوزاد را تعویض می کنید.

کدامیک از نشانه های زیر نشانه افزایش ICP در نوزاد مبتلا به هیدروسفالی نیست.

☐ استرابیسم در نوزاد

☐ کاهش رفلکس ساکینگ و مورو در نوزاد

☐ گریه تیز و بلند و بیقراری

☒ هیپوترمی در نوزاد

23 نوزاد نارس 34 هفته با دیسترس تنفسی در بخش نوزادان بستری است، در مورد تغذیه نوزاد تصمیم مناسب شما چیست؟

☒ گاوآژ از طریق فیدینگ تیوپ دهانی

☐ TPN

☐ تغذیه دهانی با شیر مادر

☐ NPO نگهداشتن نوزاد

انتخاب برای برگ

صفحه: 23 از 36

مرور پاسخ ها

صفحه بعدی

⌚ زمان مانده:

پرستاری بیماری های کودکان 2 -

نام درس:

پرستاری بیماریهای کودکان

عنوان آزمون:

25 کدام گزینه در مورد Anus Imperforate صحیح می باشد؟

✓ از مراقبت های پیش از عمل شامل NPO و برقراری مایعات وریدی است.

○ درمان آن محافظه کارانه و با انما ی پنوماتیک تحت هدایت رادیولوژیست می باشد.

○ مسئولیت پرستار ، مربوط به شناسایی ناهنجاری های ناحیه مقعد و راست روده نیست.

○ آمادگی روده و کاهش فشار دستگاه گوارش، جزو مراقبت های بعد از عمل می باشد.

انتخاب برای برگشت به

صفحه : 25 از 26

مرور پاسخ ها

➤ صفحه بعدی

25 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

- ☐ شایع ترین محل وقوع درهم رفتگی روده، در بچه ایلئوسکال است.
- ☒ جراحی به روش فردت رامستد، رایج ترین ترمیم ناهنجاری های انورکتال شیرخواران است.
- ☐ فرورفتگی فونتانل و جسمانی کود افتاده در کودک دچار اسهال، نشانه دهیدراتاسیون حرجه متوسط می باشد.
- ☐ امفتوسل، ناهنجاری مادرزادی در محل ناف نوزاد است.

عنوان آزمون:	پرستاری بیماریهای کودکان	نام درس:	پرستاری بیماری های کودکان 2 -	زمان ماند:	⌚
نام آزمون دهنده:	ساناز مرادیپور				

25 کدام گزینه، در خصوص تست گاتری در نوزادان، صحیح می باشد؟

- ☐ خون تازه از بند ناف لازم است.
- ☐ قابلیت تشخیص بیماری را، در مقادیر بالاتر از چهار میلی گرم ادسی لیتر دارد.
- ☒ رشد باسیلوس سوبتیلیس در صورت فنیل آلانین کم، میسر است.
- ☐ در وجود متابولیت، ادرار به رنگ سبز تغییر می یابد.

28 کدام گزینه از علایم هیپوترونیسم مادرزادی در نوزاد می باشد؟

- ☐ سفتی بدن
- ☐ خواب زیاد
- ☐ وزن تولد نوزاد ترم بیش از 4 کیلو
- ☒ پ و ج

○ ھېتو ئېگ

عنوان آزمون: پرستاری بیماریهای کودکان - نام درس: پرستاری بیماری های کودکان 2 - زمان مقدم: 00:23:41 - زمان صفحه: زمان صفحه

درمواقع آماده سازی و انجام پروسیجرهای بالینی برای کودکان در دوز شیرخوارگی کدام مورد صحیح نمی باشد؟

- ☐ یک شی آشنا مثل اسباب بازی یا عروسک کنار کودک قرار دهید.
- ☒ در صورت تمایل والدین در محل انجام پروسیجر حضور داشته باشند.
- ☐ بهتر است پروسیجر را در تخت بیمار انجام دهید.
- ☐ پروسیجر به وسیله پرستار مسئول مراقبت از کودک بیمار انجام شود.

صفحه : 82 از 86

صفحه بعدی

11:18

36 کودک دچار اسهال، دارای علائم کاهش تورگور پوست، خشکی مخاط پوششی دهان، فرورفتگی فونتانل و چشمار

☐ درجه دهیدراتاسیون خفیف است.

☐ درمان اولیه، 50 ORS میلی لیتر/کیلوگرم/ ساعت می باشد.

☒ میزان دهیدراتاسیون ۷-۹ درصد است.

☐ درمان اولیه، رینگر 40 میلی لیتر/کیلوگرم/ ساعت می باشد.

انتخابات برای برگشت به صفحه (4)

صفحه : 32 از 36

مرور پاسخ ها

صفحه بعدی

11:20 AM
6/7/2021

32 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

- ☒ هموسیدروزیس، همان رسوب آهن در بافت ها و آسیب سلولی و فیبروز بافت می باشد.
- ☐ استفراغ جهنده از علائم اصلی تنگی پیلور می باشد.
- ☐ نارس، مهمترین عامل خطر انتروکولیت نکروزان می باشد.
- ☐ در نوزاد مبتلا به امفالوسل، عفونت عامل تهدید آمیز دائم قبل از جراحی محسوب می شود.

00:21:14

زمان مانده:

پرستاری بیماری های کودکان 2 -

نام درس:

پرستاری بیماریهای کودکان

عنوان آزمون:

34 کدام گزینه جزو استانداردهای مدیریت درد در کودکان نمی باشد؟

☐ سیاست ها و خط مشی ها جهت تامین یکپارچگی و کیفیت ارزیابی و اداره درد بایستی تهیه شوند.

☒ از ابزارهای متنوع سنجش درد در قبل و بعد از مداخلات مدیریت درد استفاده شود.

☐ پرسنل تازه وارد از لحاظ دارا بودن صلاحیت مدیریت درد، ارزیابی شوند.

☐ اعضای تیم مراقبت سلامت باید با یکدیگر و خانواده در ایجاد رویکرد بررسی و اداره درد همکاری و مشارکت نمایند.

33 درمواقع آماده سازی و انجام پروسیجرهای بالینی برای کودکان در دوره شیرخوارگی، کدام مورد صحیح نمی باشد:

☐ یک شی آشنا مثل اسباب بازی یا عروسک کنار کودک قرار دهید.

☐ در صورت تعایل والدین در محل انجام پروسیجر حضور داشته باشند.

☒ بهتر است پروسیجر را در تخت بیمار انجام دهید.

☐ پروسیجر به وسیله پرستار مسئول مراقبت از کودک بیمار، انجام شود.

انتخاب برای برگشت به صفحه (4 از 4)

صفحه : 33 از 36

مرور پاسخ ها

صفحه بعدی

31:21 AM
6/7/2021

۱) کدامیک از ناشتهای هانی زیر آسیب روانی بیشتری به پاتین وارد می کند؟

شعوبه: ۹

- ☐ شکاف نام
- ☐ شکاف لب
- ☐ اختلالی مشابه
- ☒ آهنگ جنسی

۲) دو گزارش کردن جرم، هرگاه چنین نواقی به پاتین کشم مورد زیر صحیح است.

شعوبه: ۹

- ☐ تأیید کردن به بی اهمیت بودن جرم
- ☒ تأیید بیشتر بر روی قسمت های سالم بدن
- ☐ تأیید بر نقلی درمان بودن جرم
- ☐ نشان دادن عصب به مادر تا تأیید او آن

۳) کدام یک از کوردهای پرستاری دو کودک مبتلا به ابرام جنسی، جزو حیوانات اهلا تاکی محسوب می شود؟

شعوبه: ۹

- ☒ گوی دادن به پاتین
- ☐ تأیید بر امکان تشکیل به صورت یک جنسی
- ☐ نشان دادن تصویر قبل بعد از درمان
- ☐ مخالفت بر گزارش عصب

۴) پاتین با مصوبت قرارگیری سر دو زنجار بکاردیوگرافیک مبتلا به شکاف کام قبل از عمل جراحی کدام است؟

شعوبه: ۹

- ☐ جابجایی ده پشت و سر اقلی
- ☒ جابجایی ده پشت و سر ۳۰ درجه بیشتر از بعد
- ☐ قرار گرفتن در قسمت مخالف و سر دو وضعیت اقلی
- ☐ قرار گرفتن در قسمت مخالف و سر دو وضعیت اقلی

۵) کدامیک از نشانه های زیر برادر دهنه را نشانی شدن نوزاد نیست؟

شعوبه: ۹

- ☒ کاهش دفع مدفوع
- ☐ کاهش وزن و قوت
- ☐ کاهش توکر پوسنی
- ☐ کاهش توکر پوسنی

۶) کدامیک از مراقبت های پرستاری زمو هرچند به کمک مبتلا به اختلالی مشابه نیست؟

شعوبه: ۹

- ☐ استفاده از پدها اسپونژ برای محافظت پوست ادرار
- ☒ استفاده از گوا استرین خشک برای محافظت از مخاط دهانه
- ☐ تشویه مدفوع بدن
- ☐ آموزش پاهای

۷) مهمترین مراقبت پرستاری بعد از شکاف کام چیست؟

شعوبه: ۹

- ☐ آموزش پاهای
- ☒ کنترل تنفس
- ☐ محافظت محل عمل
- ☐ مایع درمانی

۸) کدام یک از نواقی مناسبی پشت دو نوزادی که به پشت همگی کنار می قرار شده است، است؟

شعوبه: ۹

- ☐ کمک به کاهش بی قراری نوزاد
- ☐ بهبود اسپونژاسیون نوزاد
- ☒ کنترل تنفس نوزاد
- ☐ کمک به خروج ترشحات

۹) برای پیشگیری از آسیب پوسنی نوزاد کدام اقدام کمک کننده است؟

شعوبه: ۹

- ☐ استفاده از لباس برای سر کردن جسد ها
- ☒ استفاده از جسد های باکریو
- ☐ استفاده از جسد های گندنی
- ☐ استفاده از لکویه است

۱۰) هدف ترین اقدام در کودک ۶ ماهه ای که دچار اسپیرامیون تنفسی شده است چیست؟

شعوبه: ۹

- ☐ سرجه کردن کودک
- ☐ ایدل فشار دو زیر دفرانگ
- ☒ خرد کردن دو بین دو شکاف و فشار دادن قفسه سینه
- ☐ تلاش جهت خارج کردن جسد خارجی با انگشت

3. کدامیک از مراقبت های پرستاری کودک مبتلا به سندرم نفروتیک نمی باشد؟

☐ ایزوله معکوس

☒ محدودیت پروتئین دریافتی

☐ توزین روزانه

☐ محدودیت آب و نمک

نام درس: پرستاری بیماریهای کودکان - زمان مانده: 01:06:16 نام آزمون دهنده:

19. کدام اقدام پرستاری زیر برای پیشگیری از عفونت در کودک مبتلا به سندرم نفروتیک در مرحله حاد بیماری حیاتی است؟

- ☐ کنترل مرتب فشار خون
- ☒ ایزوله معکوس
- ☐ تشویق کودک به استراحت مطلق
- ☐ محدود کردن مصرف آب و نمک